

Ende Februar – geeignete Bedingungen für die Bodenbearbeitung von Feldern für die Aussaat von Sommerkulturen, den Schnitt und den Pflanzenschutzspritzungen in Dauerkulturen.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.02.2024 Брой: 2/2024



Ende Februar werden die agrometeorologischen Bedingungen weiterhin von durchschnittlichen Tagestemperaturen über dem biologischen Minimum geprägt sein, das für die Wiederaufnahme und den Fortschritt der vegetativen Prozesse in Wintergetreidekulturen erforderlich ist. Am Ende der Herbst-Winter-Periode der Feuchtigkeitsansammlung liegen die Bodenfeuchtereserven im Ackerland in der Ein-Meter-Schicht zwischen 70 % und 90 % der Feldkapazität (FK).

Während des Zeitraums wird in spät gesäten Weizen- und Gerstenbeständen, die in ihrer Entwicklung zurückliegen, das Stadium des dritten Blattwachstums beobachtet werden. Das Bestockungsstadium wird in den Beständen in der Donauebene und an vereinzelt Standorten in den südlichen Regionen des Landes beobachtet – an den agrometeorologischen Stationen Băzovec, Knezha, Novachene, Nikolaevo, Dolni Chiflik, Targovishte, Silistra, Lyubimets, Plovdiv, Pazardzhik, Kyustendil und Sandanski. Bei Steinobstarten wird Knospenschwellen auftreten.

Getreidelaufkäfer – *Zabrus tenebrioides*

An den meisten Tagen des Zeitraums, mit Ausnahme einiger Orte in den westlichen Regionen, für die Niederschlag vorhergesagt ist, werden die Bedingungen geeignet sein für: Bodenbearbeitung auf Feldern, die für die Aussaat mit Frühjahrskulturen vorgesehen sind; Schnitt- und Pflanzenschutzspritzungen in Dauerkulturen; Kontrolle von Weizen- und Gerstenbeständen auf das Vorhandensein und die schädliche Aktivität der Feldmaus und der Larven des Getreidelaufkäfers. Angesichts der Wiederaufnahme der Vegetation in Wintergetreidekulturen sollte der Abschluss der Stickstoffdüngung der Bestände Priorität haben.

Quelle: NIMH