

# September – die Bedingungen werden die Bildung eines zusätzlichen Ertrags bei späten Gemüsekulturen ermöglichen

Автор(и): Растителна защита

Дата: 07.09.2024 Брой: 9/2024



An den meisten Tagen der ersten Septemberdekade werden die agrometeorologischen Bedingungen von Temperaturen über den klimatischen Normwerten bestimmt, was die Beendigung der letzten Entwicklungsstadien bei späten Feldkulturen beschleunigen wird. Bei späten Maishybriden werden die Wachsreife und die Vollreife beobachtet. In der ersten Hälfte des Zeitraums wird in den östlichen Regionen eine höhere Niederschlagswahrscheinlichkeit vorhergesagt sowie eine Verbesserung der Bodenfeuchte in den oberen Schichten und der Bedingungen für die Durchführung der Aussaatvorbereitung. Im übrigen Teil der

Feldflächen des Landes werden die Bedingungen die Freigabe von Flächen nach der Ernte von reifer Sonnenblume und Mais ermöglichen.

In der zweiten Dekade des Monats ist eine Änderung der agrometeorologischen Bedingungen zu erwarten. Für die meisten Tage des Zeitraums wird ein relativer Temperaturrückgang vorhergesagt, zusammen mit Bedingungen für Niederschläge an mehr Orten in den Feldregionen. Der erwartete Niederschlag wird nach der verstärkten Trockenheit am Ende des Sommers den Zustand der oberen Bodenschichten und die Bedingungen für eine qualitativ hochwertigere Aussaatvorbereitung und Aussaat von Winterraps verbessern. Der optimale agrotechnische Zeitrahmen für die Aussaat von Raps ist bis zum Ende der zweiten Septemberdekade.

Die vorhergesagten Niederschläge in der zweiten und der ersten Hälfte der dritten Dekade werden das Risiko für die Entwicklung von Pilzpathogenen in der reifenden Obst- und Gemüseproduktion erhöhen: Graufäule an Trauben, Späte Braunfäule an den Früchten spätreifender Obstbaumsorten, Falsche Mehltäupilze an Gemüsekulturen.



## *Baumwollkapselseule*

Im September sollten bei Gemüsekulturen aus später Feldproduktion Pflanzenschutzspritzungen gegen die Raupen der dritten Generation der Baumwollkapselseule nicht unterschätzt werden, da sie Schäden verursachen und die Qualität der Gemüseernte beeinträchtigen.

In der zweiten Hälfte der dritten Dekade werden trockenes Wetter und günstige Bedingungen für die Ernte der reifen Traubenernte erwartet.

Im September werden keine kritischen Minimaltemperaturen vorhergesagt, und die Bedingungen werden die Bildung von Zusatzproduktion bei späten Gemüsekulturen ermöglichen.

*Quelle: NIMH*