

# Im März liegen die Temperaturen um und über den klimatologischen Normwerten, die Niederschläge um und unter den Normen.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 09.03.2025 Брой: 3/2025



In der ersten Hälfte des ersten Dekads werden die vorhergesagten Temperaturen in Bereichen liegen, die die Entwicklung der landwirtschaftlichen Kulturen hemmen.

In der zweiten Hälfte des Dekads ist ein erheblicher Temperaturanstieg zu erwarten, und ihre mittleren Tageswerte werden das biologische Minimum für die Wiederaufnahme der vegetativen Prozesse bei Wintergetreide erreichen und überschreiten.

Die vorhergesagten überdurchschnittlichen Temperaturen im zweiten Märzdekad werden die Vegetation der herbstausgesäten Bestände fördern. In dieser Zeit werden einige der Weizen- und Gerstenbestände, die sich derzeit im Dreiblattstadium befinden, in das Bestockungsstadium eintreten.

Die erwarteten Höchsttemperaturen bis zu und über 20°C werden auch die vegetativen Prozesse in einem Großteil der mehrjährigen Kulturen aktivieren. Bei Obstkulturen werden bei den früh blühenden Steinobstarten (Mandel, Aprikose, Pfirsich) die Stadien des Knospenschwellens und Knospenaufbruchs ablaufen. In Weinbergen in Feldlagen wird Safffluss zu beobachten sein.

Die Bedingungen im Zeitraum werden geeignet sein für die Kopfdüngung von Winterkulturen mit Stickstoffmineraldüngern, für die Durchführung der Vorsaadbodenbearbeitung und die Aussaat von Frühjahrskulturen (Wicke, Erbsen, Sommergerste).

Zu Beginn des zweiten Märzdekads sind keine Niederschläge zu erwarten, was eine Gelegenheit für die rechtzeitige Durchführung vorbeugender Vorblütespritzungen in Obstanlagen mit kupferhaltigen Fungiziden gegen die Erreger der Blütenfäule, der Kräuselkrankheit des Pfirsichs, des Schorfes und anderer Pathogene bieten wird.

Im dritten Dekad werden die erwarteten Temperaturen, um und über den klimatologischen Normen, die aktiven vegetativen Prozesse in den landwirtschaftlichen Kulturen aufrechterhalten. Gegen Ende des Monats wird bei den Wintergetreidearten, die im Herbst bestockt haben, ein Anstieg des Bestockungskoeffizienten zu beobachten sein.

Im März werden bei Obstkulturen die Stadien des Knospenschwellens und Knospenaufbruchs ablaufen. Ende des Monats wird bei den früh blühenden Arten – Mandel, Aprikose und Pfirsich – das Blütenknospenstadium zu beobachten sein, und an einigen Standorten in den südlichen Regionen – der Blühbeginn. In Weinbergen in Feldlagen wird Safffluss zu beobachten sein.

*Im Laufe des Monats werden die vorhergesagten Minustemperaturen bis zu minus 7°C eine Gefahr für Obstkulturen im Knospen- und Blühstadium darstellen.*

Die Niederschläge im März werden die Bodenfeuchtevorräte in der 100 cm Bodenschicht erhöhen. Ende Februar ist in den meisten Landesteilen, mit Ausnahme einiger Orte in den östlichen Regionen, der Stand der Bodenfeuchtevorräte für Wintergetreide in der Ein-Meter-Schicht für die Jahreszeit niedrig – in Teilen der Donauebene und der südlichen Regionen unter 70% der Feldkapazität (FK). Normalerweise erreichen die

Bodenfeuchtevorräte in der Ein-Meter-Schicht am Winterende in Jahren ohne klimatische Anomalien Werte bis zur FK.

Im März werden günstigere Bedingungen für die Vorsaadbodenbearbeitung von Flächen, die für die Aussaat mit früh- und mittelfrühreifenden Frühjahrskulturen vorgesehen sind, in der zweiten Monatshälfte eintreten. Mitte März beginnt in Südbulgarien die agrotechnische Periode (15.-20.03) für die Sonnenblumenaussaat, und in der Mitte des dritten Dekads (25.03–5.04) – in der Donauebene.

*Quelle: NIMH*