

Ende April – wechselhaftes Wetter mit Niederschlag und Bedingungen für die Bildung von Frost

Автор(и): Растителна защита

Дата: 26.04.2025 Брой: 4/2025



Ende April werden die agrometeorologischen Bedingungen durch wechselhaftes Wetter und Temperaturen nahe der klimatischen Norm für das dritte April-Jahrzehnt bestimmt. Die Niederschläge am Ende der vergangenen Periode erhöhten an vielen Orten in den westlichen Regionen die Feuchtigkeitsreserven in den oberen Bodenschichten. In den ersten Tagen der Periode sind Niederschläge vorhergesagt, was auch die Bedingungen für die Vegetation landwirtschaftlicher Kulturen in den östlichen Regionen des Landes verbessern wird.

Die Entwicklung von Wintergetreide und der ausgesäten Frühjahrskulturen wird in der zweiten Hälfte der Periode unter unterdurchschnittlichen thermischen Bedingungen verlaufen. Ende April wird das Schossen im Weizen massiv vorherrschen. Anfang Mai wird in der Gerste an einigen Orten in den Feldregionen auch der Beginn des Ährenschiebens beobachtet werden. In den ausgesäten Beständen von Sonnenblume und Mais werden je nach Aussaattermin Auflaufen und anfängliche Blattbildung stattfinden.

Schädlinge im Mais



Grauer Maisrüssler (Tanymecus dilaticollis Gyll.)

In den Anfangsstadien der Vegetation von Mais und Sonnenblume sollten die Bestände auf das Vorhandensein eines gefährlichen Schädling – des grauen Maisrüsslers – überwacht werden. Wenn die Schädlingsdichte die wirtschaftliche Schadensschwelle (Economic Injury Level, EIL) überschreitet, müssen die Kulturen bei erster Gelegenheit mit einem der zugelassenen Insektizide behandelt werden (EIL im Auflaufstadium: Sonnenblume – 2 Käfer pro m²; Mais > 2 Käfer pro m²).



Falscher Mehltau der Rebe (Plasmopara viticola)

In der Rebe wird sich das 2.-3. Blatt bilden, und in den äußersten südlichen Regionen werden die Blütenstände erscheinen. In dieser Periode ist es ratsam, vorbeugende Spritzungen der Reben gegen die Erreger von Falschem Mehltau und Echtem Mehltau durchzuführen.

Pflanzenschutzmaßnahmen in Gemüsekulturen im April

Ende April ist ein deutlicher Rückgang der Mindesttemperaturen und Bedingungen für Frostbildung vorhergesagt, was beim Pflanzen von Gemüsesetzlingen in Gärten berücksichtigt werden sollte.