

In der letzten Maiwoche wird die Entwicklung der landwirtschaftlichen Kulturen bei Temperaturen unter den klimatischen Normen und mit wirtschaftlich nutzbaren Niederschlägen verlaufen.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.05.2025 *Брой:* 5/2025



Im Laufe des nächsten Siebentageszeitraums werden die agrometeorologischen Bedingungen weiterhin von wechselhaftem Wetter bestimmt sein. In diesem Zeitraum sind agrarmeteorologisch signifikante Niederschläge sowie eine Verbesserung der Bodenfeuchtevorräte selbst in tieferen Bodenschichten prognostiziert.

Die Niederschläge in der ersten und zweiten Maidekade waren ungleichmäßig verteilt. In vielen Gebieten Südbulgariens erreichten und überschritten die Maienniederschläge die monatlichen Normen (Blagoevgrad, Haskovo, Kardzhali, Elhovo, Chirpan, Karnobat, Burgas). In Teilen der südlichen Regionen erreichten die Bodenfeuchtevorräte in den 50- und 100-cm-Schichten Werte bis zu und über 85 % der Feldkapazität (FK), optimal für die Entwicklung der Wintergetreidekulturen und der ausgesäten Frühjahrskulturen.

Im Gegensatz zu den südlichen Regionen ist in Gebieten Nordostbulgariens (Agrometeorologische Station Silistra) infolge der unterdurchschnittlichen Niederschläge im April und in der ersten Maihälfte der Bodenfeuchtevorrat für die Wintergetreidekulturen am Ende der zweiten Dekade niedrig – unter 65 % der FK.

In der letzten Maikwoche wird in den nordöstlichen Regionen eine wesentliche Verbesserung der Bodenfeuchtevorräte erwartet, was für die Wintergetreidekulturen, die hohe Ansprüche an die Bodenfeuchte stellen, von großer Bedeutung ist.

Während des Zeitraums wird die Entwicklung der landwirtschaftlichen Kulturen bei Temperaturen unter den klimatologischen Normwerten voranschreiten. Bis Ende Mai erfolgt bei den Wintergetreidekulturen die Kornbildung und Kornfüllung.



In dieser Zwischenphasenperiode verursachen die Larven der Getreidewanze Schäden am Weizen, was eine Feldbegehung der Bestände erforderlich macht. Bei Überschreiten der wirtschaftlichen Schadensschwelle (2

Larven/m²) sollte eine Behandlung bei erster Gelegenheit durchgeführt werden.

Bei Sonnenblume und Mais erfolgt die Blattbildung.

Ende Mai überwiegt bei der Rebe die Blüte der Infloreszenzen, ein kritisches Stadium für eine Infektion mit Falschem Mehltau und Echtem Mehltau.

In der letzten Maikwoche wird der erhöhte Feuchtigkeitsgehalt in den oberen Bodenschichten die Durchführung saisonaler Bodenbearbeitungsmaßnahmen einschränken. Während des Zeitraums ist Hagel zu erwarten. Für von Hagel betroffene Obstbäume, Gemüsekulturen und Weinberge sind Behandlungen mit kupferhaltigen Fungiziden ratsam, um das Risiko von Sekundärinfektionen durch Pathogene zu verringern.

Quelle: NIMH