


Winterliches Spritzen von Obstbäumen

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.02.2016 Брой: 2/2016



Führen Sie diesen Eingriff bei trockenem Wetter im Monat Februar durch. Die Winterspritzung darf nicht mit dem Winterschnitt zusammenfallen, da für die Spritzung Pflanzenschutzmittel verwendet werden, die bei Kontakt mit Schnittwunden Schäden verursachen. Ruhige, windstille Tage eignen sich für die Spritzung, da so keine Gefahr besteht, dass die Brühe vom Wind verweht wird.

Wann: Während der Ruhephase der Bäume.

Ziel: Die Stadien von Schädlingen und Krankheitserregern zu vernichten, die an Stämmen und Ästen überwintern:

- Kräuselkrankheit, Schrotschusskrankheit, Frühbraunfäule, Taschenkrankheit, Bakterienbrand;
- Wintereier der Obstbaumspinnmilbe, Blattläuse, Birnen- und Apfelblattsauger, Frostspanner, San-José-Schildlaus und andere Napfschildläuse, Pflaumenschildlaus, Apfelwickler, Weißdornspinnmilbe, Gemeine

Spinnmilbe und Gelbe Obstbaumspeinnmilbe;

Wichtige Hinweise:

- Eine Winterspritzung gegen Schädlinge ist nur notwendig, wenn eine nachgewiesene Populationsdichte über der wirtschaftlichen Schadensschwelle vorliegt. Bei Krankheiten ist sie jedoch obligatorisch.
- Die beste Wirkung der Winterspritzung wird erzielt, wenn sie unmittelbar vor dem Knospenschwellen durchgeführt wird. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die Entwicklung der überwinterten Stadien von Insekten und Milben. Der Embryo im Ei befindet sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium, und die überwinterten Raupen und adulten Insekten verlassen ihre Winterquartiere und bewegen sich entlang der Baumäste.
- Die Mittel und Ihre Arbeit sind verschwendet, wenn Sie nicht gründlich spritzen. Benetzen Sie alle Teile der Äste, Zweige und Verzweigungspunkte, wo sich Schädlinge am häufigsten ansammeln, sowie den Stamm gründlich mit der Brühe. Mit anderen Worten: "Baden" Sie den gesamten Baum.

Mittel:

- Gegen Krankheiten – Bordeauxbrühe 1 %, und nur gegen Kräuselkrankheit – zusätzlich dazu können die Fungizide Funguran OH 50 WP – 0,15 %, Champion – 0,3 %, Dithane DG – 0,3 %, Dithane M-45 – 0,3 % oder Thiram 80 WG – 0,3 % verwendet werden.
- Gegen Schädlinge – Parazomer 0,3 %.

Wenn Sie Birnen haben

Bei einer Temperatur von 3–5 °C und sonnigem Wetter wandert die Birnenblattsauger innerhalb der Baumkrone und beginnt mit der Nahrungsaufnahme, und bei 8 °C beginnt sie mit der Eiablage. Dies ist der Zeitpunkt für die Spritzung. Gute Wirksamkeit erzielen Alfamec 100 EC – 0,0125 % oder Sumi Alpha 5 EC – 0,03 %. Nach Beginn der Eiablage wird Deltamec 2.5 EC – 0,03 % empfohlen.