

Agrometeorologische Prognose für August 2016

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.08.2016 Брой: 8/2016



Ein Temperaturrückgang und eine Normalisierung der thermischen Bedingungen werden zur Mitte der ersten Dekade erwartet. Während der Dekade wird in Westbulgarien Niederschlag prognostiziert sowie eine Verbesserung der Bedingungen für die Entwicklung der landwirtschaftlichen Kulturen.

Im August wird die Entwicklung der landwirtschaftlichen Kulturen bei Temperaturen um und über den klimatologischen Normen verlaufen und in einem großen Teil des Landes – unter Bedingungen eines Bodenfeuchtedefizits. Ende Juli waren die Bodenfeuchtereserven in der 50- und 100-cm-Schicht bei Frühjahrskulturen, außer an einigen Orten in den westlichen Regionen, knapp – unter 50–60 % der Feldkapazität.

Zu Beginn des August wird die prognostizierte trockene und heiße Witterung, stellenweise mit extrem hohen Maximaltemperaturen bis zu 38–39°C, den normalen Ablauf der physiologischen

Prozesse in Frühjahrskulturen stören und sich negativ auf die Blüte und Befruchtung bei späten Maishybriden und Gemüsekulturen auswirken.

Ein Temperaturrückgang und eine Normalisierung der thermischen Bedingungen werden zur Mitte der ersten Dekade erwartet. Während der Dekade wird in Westbulgarien Niederschlag prognostiziert und eine Verbesserung der Bedingungen für die Entwicklung der landwirtschaftlichen Kulturen. In den östlichen und südlichen Regionen wird sich das Bodenfeuchtedefizit vertiefen, was den Einsatz erhöhter Bewässerungsgaben bei späten Frühjahrskulturen erforderlich machen wird.

Während der ersten Augustdekade wird bei frühen Maishybriden das Milchreifestadium und der Übergang von Milch- zur Wachsreife stattfinden. Bei Sonnenblumen wird an einigen Orten in der Donauebene und in den südlichen Regionen des Landes der Beginn des Abreifestadiums zu beobachten sein.

In der zweiten Augushälfte wird ein Teil der späten Feldkulturen ihre Entwicklung abschließen. Bei Sonnenblumen wird die massenhafte technische Reife und bei Sojabohnen das Abreifestadium zu beobachten sein. Ende des Monats wird bei mittelspäten Maishybriden die Wachsreife vorherrschen. Bei Baumwolle wird der Beginn der Kapselöffnung zu beobachten sein.

Während der dritten Augustdekade wird eine Änderung der agrometeorologischen Bedingungen erwartet. Eine erhöhte Niederschlagswahrscheinlichkeit wird prognostiziert sowie eine Verbesserung des Wasserzustands in den oberen Bodenschichten, was von großer Bedeutung für eine qualitativ hochwertigere Tiefenlockerung und die Aussaatvorbereitung der für die Winterrapsaussaat vorgesehenen Flächen ist. Ende August beginnt der agrotechnische Zeitraum für die Aussaat von Ölraps.

Quelle: NIMH-BAS