

Agrometeorologische Prognose für den Monat September

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.09.2016 Брой: 9/2016



Signifikante Niederschläge sind im ersten Dekade nicht zu erwarten. An den meisten Tagen des Zeitraums werden die Bedingungen die Durchführung der saisonalen Feldarbeiten ermöglichen - Ernte von Sonnenblumen und früheren Maishybriden, Durchführung von Tiefenpflügen und der Vorsaadbodenbearbeitung auf Flächen, die für die Aussaat von Winterraps vorgesehen sind. Der optimale agrotechnische Zeitraum für die Rapsaussaart liegt in der ersten Septemberhälfte.

Im Laufe des Monats wird ein Großteil der Rotweinrebsorten, früher als die üblichen Termine, die technologische Reife erreichen. Eine Traubenernte mit hohem Zuckergehalt wird erwartet.

Im September wird die Entwicklung der späten landwirtschaftlichen Kulturen, die die negativen Folgen der anhaltenden Sommerdürre überwunden haben, bei Temperaturen um und über den klimatologischen Normen verlaufen. Die Niederschläge Ende August, stellenweise über 25-30 l/m² (Widin, Lom, Lowetsch, Weliko Tarnowo, Schumen, Silistra, Plowdiw, Sliven), kamen für einen Teil der Sommerungen zu spät, die aufgrund

eines Bodenfeuchtedefizits ihre Vegetation vorzeitig abgeschlossen haben. Diese Niederschläge verbesserten die Bedingungen für die Entwicklung von Zweitfrüchten und späten Maishybriden.

Anfang September werden die späten Maishybriden in der Milchreifephase sein, während die mittelspäten eine verbreitete Wachs- und Vollreife zeigen werden.

Signifikante Niederschläge sind im ersten Dekade nicht zu erwarten. An den meisten Tagen des Zeitraums werden die Bedingungen die Durchführung der saisonalen Feldarbeiten ermöglichen - Ernte von Sonnenblumen und früheren Maishybriden, Durchführung von Tiefenpflügen und der Vorsaadbodenbearbeitung auf Flächen, die für die Aussaat von Winterraps vorgesehen sind. Der optimale agrotechnische Zeitraum für die Rapsaussaat liegt in der ersten Septemberhälfte.

Zu Beginn des zweiten Dekaden wird ein signifikanter Temperaturrückgang, Niederschläge und ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Pathogenen, die Fäulnis an der reifenden Obsternte und Traubenernte verursachen, prognostiziert - Grauschimmelfäule an Trauben (*Botrytis cinerea*), Monilia-Fruchtfäule (*Monilia fructigena*) an den Früchten der Herbst-Winter-Obstsorten.

In der zweiten Septemberhälfte werden die Endphasen der Entwicklung der späten landwirtschaftlichen Kulturen unter den für das Sommerende und Herbstanfang üblichen thermischen Bedingungen verlaufen. Bis zum Ende des zweiten Dekaden wird ein Großteil der späten Maishybriden Wachs- und Vollreife zeigen. Während des dritten Dekaden wird Baumwolle in einer verbreiteten Reifephase sein.

Zu Beginn des dritten Dekaden werden die prognostizierten Niederschläge die Bodenfeuchtereserven in den oberen Schichten verbessern, was von erheblicher Bedeutung für den normalen Verlauf der Anfangsvegetationsphasen von Winterraps ist. Bis Ende September werden innerhalb des agrotechnischen Zeitraums gesäte Rapspflanzen in der Auflaufphase sein.

Im Laufe des Monats wird ein Großteil der Rotweinrebsorten, früher als die üblichen Termine, die technologische Reife erreichen. Eine Traubenernte mit hohem Zuckergehalt wird erwartet.

Quelle: NIMH-BAS