

Die agrometeorologischen Bedingungen sind für tiefes Pflügen und den Schnitt im Apfel- und Birnenanbau geeignet.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 25.12.2016 Брой: 12/2016



Zu Beginn des Winters sind die Einschätzungen zum Zustand der herbstausgesäten Kulturen unterschiedlich. Der Zustand der Wintergetreidekulturen und des Winterrapses in Nordbulgarien ist besser. In den äußersten südlichen Regionen sind einzelne Weizenbestände aufgrund des Bodenfeuchtigkeitsdefizits im Auflaufstadium vertrocknet. In der folgenden Periode werden die Bedingungen in den meisten Feldregionen tiefes Pflügen und den Schnitt winterharter Kernobstarten (Apfel, Birne) ermöglichen.

An den meisten Tagen der nächsten Siebentageperiode werden die agrometeorologischen Bedingungen durch relativ trockenes Wetter und Temperaturen über den klimatischen Normen für das dritte Dezemberdrittel bestimmt. In den Feldregionen werden die durchschnittlichen

Tagestemperaturen in Bereichen liegen, die die herbstausgesäten Kulturen in Ruhe halten. Bei Weizen und Gerste werden das dritte Blatt- und das Bestockungsstadium vorherrschen, und bei Winterraps – das Rosettenstadium.

Zu Beginn des Winters sind die Einschätzungen zum Zustand der herbstausgesäten Kulturen unterschiedlich – von gut bis unbefriedigend und schlecht. Der Zustand der Wintergetreidekulturen und des Winterrapses in Nordbulgarien ist besser. Stellenweise in Südbulgarien ist die anhaltende Herbsttrockenheit der Grund für die ungleichmäßige Bestandsdichte und die verzögerte Vegetation der Kulturen. Die Höhe eines Teils der Wintergetreidebestände beträgt 5–6 cm, und die von Raps – 10–12 cm.

In den äußersten südlichen Regionen sind einzelne Weizenbestände aufgrund des Bodenfeuchtigkeitsdefizits im Auflaufstadium vertrocknet.

In der folgenden Periode werden die Bedingungen in den meisten Feldregionen tiefes Pflügen und den Schnitt winterharter Kernobstarten (Apfel, Birne) ermöglichen.

Quelle: NIMH-BAS