

Wer verursacht das vorzeitige Abfallen von Pflaumenfrüchten?

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.02.2017 Брой: 2/2017



Pflaumenbäume blühen üppig, aber von Mai bis zur Ernte kommt es zu vorzeitigem Fruchtansatz- und Fruchtfall, was die Erträge erheblich mindert. Wenn die Ursachen bekannt sind, könnten einige davon verhindert werden.

- Der junge Fruchtansatz fällt bald nach der Blüte ab. Ursache – Fehlen eines Samens aufgrund unzureichender Befruchtung oder Degeneration der Samenanlagen.
- Der Junifruchtfall (Junifall) – von der zweiten Maihälfte bis zur ersten Julihälfte. Ursache – unzureichende Anreicherung von Assimilaten in den Pflanzen im Vorjahr und Wassermangel.
- Die Früchte fallen mit ihren Stielen ab, weisen zwei Löcher auf und riechen nach Baumwanze. Der Fall beginnt im Mai und endet Anfang Juni. Ursache – Schwarze Pflaumenfruchtwespe und Gelbe Pflaumenfruchtwespe.

- Die Früchte fallen in der zweiten Junihälfte und Anfang Juli ab. Im Kern der abgefallenen Früchte befindet sich eine weißliche Larve mit braunem Kopf, ohne Beine und einem an beiden Enden spitz zulaufenden Körper. Ursache – samenfressende Insekten der Gattung Eurytoma.
- Vorerntefruchtfall. Ursache – gestörtes Gleichgewicht zwischen Auxinen und Ethylen.