

Manna am Rebstock (*Plasmopara viticola*)

Автор(и): Растителна защита
Дата: 08.05.2017 Брой: 5/2017



Je nach Alter der Blätter bildet der Falsche Mehltau zwei Arten von Flecken: ölige und mosaikartige. Auf deren Unterseite bildet sich ein weißer, sporenbildender Belag. Bei starkem Befall vertrocknen die Blätter und fallen vorzeitig ab. Unter günstigen Bedingungen (relative Luftfeuchtigkeit über 75%) erscheinen chlorotische Flecken auf den Blütenständen und Trauben, auf denen sich ebenfalls ein weißer, sporenbildender Belag bildet. Befinden sich die Flecken an der Basis der Traube, vertrocknet die gesamte Traube. Die Infektion der Beeren endet, wenn sie bei Weinsorten die Größe einer „Erbse“ und bei Tafeltraubensorten die Größe einer „Bohne“ erreicht haben.

Strategie zur Schädlingsbekämpfung:

Die Behandlung wird durchgeführt, wenn günstige Bedingungen für eine Infektion auftreten (Lufttemperatur über 13°C und häufige, aber leichte Niederschläge) und während des empfindlichen phänologischen Stadiums der Rebe „Blüte“ - „Erbse“.

Zugelassene Pflanzenschutzmittel:

acrobate r – 0,25%; acrobate plus wg – 200 g/ha; axanit-cu wp – 0,25%; alial 80 wg - 75-330 g/ha; alfil wg - 0,075-0,33 kg/ha; alfil wp - 0,075-0,33 kg/ha; alfil duplo - 90-350 g/ha; amalin flo - 280 ml/ha; anthracol 70 wg – 0,15%; armetil m – 0,25%; armetil-s wp – 0,25%; banko 500 – 0,2%; bordeaux mix 20 wp – 0,5-0,6%; valbon - 180-200 / ha; verita wg – 0,2%; winker wg – 200 g/ha; vitene triplo r - 400 -450 g/ha; vitra 50 wp /cuprohy 50 wp – 0,15%; galben 8 m 65 – 0,25%; delan 700 wdg – 0,05%; dimix 500 sc - 34 ml/ha angewandt in Tankmischung mit Produkten, die Folpet enthalten; dimix 500 sc - 30 ml/ha angewandt in Tankmischung mit Produkten, die Mancozeb enthalten; ditan dg - 200 g/ha; ditan m-45 - 200 g/ha; drago 76 wp – 0,16%; enervin – 0,2%; cabrio top – 0,15%- Behandlungsintervall 7-10 Tage - 0,2% alle 10-14 Tage; katanga express - 75-330 g/ha; katanga man - 300-500 g/100 l Wasser; corseit r df – 0,25%; corseit r wp – 0,25% bis 09.2017; corseit max wp – 0,15%; cuadris 25 sc – 0,075%; cupertine m – 0,3%; cuproxat fl / tribase flowable – 0,3% bis 06.2017; cuproset gold m – 0,15%; cuprocin super m – 0,2%; lieto - 40-45 g/ha; mancozeb 80 wp – 0,3%; manfil 80 wp - 200 g/ha; manfil 75 wg - 210 g/ha; medeiro 80 wg- 75-330 g/ha; Kupferoxychlorid 50 wp – 0,25%; medyan extra 350 sc - 350 ml/ha; melody compact 49 wg - 150 -175 g/ha bis 06.2017; mical flash – 0,3%; mildicut - 350-450 ml/ha; moximat 505 wg - 240-300 g/ha; moximat 505 wp - 240 – 300 g/ha; momentum extra wg - 300 g/ha; pasodoble 70 wg - 200 g/ha; pencozeb 80 wp - 200 g/ha; pencozeb 75 wg - 210 g/ha; pergado copper 27 wg - 500 g/ha; pergado f 45 wg – 0,2%; profiler 71.1 wg- 200-225 g/ha; ridomil gold mz 68 wg – 0,25%; rumba 35 sc – 0,35%; sancozeb 80 wp - 200 g/ha; sinstar - 70-80 ml/ha; solofol - 188 g/ha; strobilurin df /discus df - 0,015 % +acrobate mz - 0,15 %; sphinx extra /vinostar - 180 g/ha; folder 80 wg - 150 g/ha; follow 80 wg/ friller 80 wg/ flowet 80 wg - 187,5 g/ha; folpan 80 wdg - 0,15 % - 0,1 % +ardent 50 sc - 0,015 %; funguran oh 50 wp – 0,15%; shavit f 72 wdg – 0,2%; champion wp/ makk 50 wp /champ wp – 0,155.