

Meteorologische Vorhersage für die zweite Augusthälfte

Автор(и): Растителна защита
Дата: 23.08.2017 Брой: 8/2017



Infolge der hohen Temperaturen in der ersten Augusthälfte in den südwestlichen Landesteilen (Region Petrich) begann die Traubenlese der Weißweinsorten Muscat Ottonel und Chardonnay früher als üblich.

In der ersten Hälfte des Zeitraums werden die prognostizierten überdurchschnittlichen Temperaturen die Endstadien der Entwicklung der späten landwirtschaftlichen Kulturen beschleunigen. Ende der zweiten Dekade wird bei mittelfrühen Maishybriden die Wachs- und Vollreife zu beobachten sein. Während des Zeitraums finden bei mittelspäten Hybriden das Milchstadium und der Übergang zur Wachsreife statt, und bei späten Hybriden – die Kornfüllung. Bei Sonnenblumen wird im Feld die technische Reife überwiegen. Zu Beginn der dritten Dekade wird bei Sojabohnen das Reifestadium, bei Baumwolle der Beginn der Kapselöffnung und bei Reis das

Milchreifestadium zu beobachten sein. Ein Teil der frühen Weißweintraubensorten in Südbulgarien wird in die technologische Reife eintreten.

Infolge der hohen Temperaturen in der ersten Augushälfte in den südwestlichen Landesteilen (Region Petrich) begann die Traubenlese der Weißweinsorten Muscat Ottonel und Chardonnay früher als üblich.

In der zweiten Hälfte des Zeitraums wird eine wesentliche Abnahme der Temperaturen und eine Änderung der agrometeorologischen Bedingungen prognostiziert. Der erwartete Niederschlag, der für einen Teil der Frühjahrskulturen in den östlichen und südlichen Regionen des Landes verspätet kommt, wird den wasserphysikalischen Zustand des Bodens in der Ackerkrume verbessern, was eine Voraussetzung für eine qualitativ hochwertigere Durchführung der Tiefenbearbeitung und der Voraussaatbearbeitung der für die Rapsaussaat vorgesehenen Flächen ist. In der dritten Augustdekade beginnen die agrotechnischen Zeitfenster für die Aussaat von Winterraps.

Günstige Bedingungen für die Durchführung der stellenweise in Südbulgarien begonnenen Sonnenblumenernte werden in der ersten Hälfte des Zeitraums auftreten.

Quelle: NIMH-BAS