

Herbstpflege im Obstgarten

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.10.2017 Брой: 10/2017



Und vernachlässigen Sie im Obstgarten nicht den Pflanzenschutz. Entfernen Sie während der Ernte der Früchte alle abgetrockneten Zweige und mumifizierten Früchte. Sammeln und vernichten Sie diese – die Erreger vieler Krankheiten überwintern darin. Kratzen Sie die alte und rissige Rinde ab – dort verbringen gefährliche Schädlinge den Winter.

Winterapfel-, Birnen-, Quitten- und Pfirsichsorten benötigen regelmäßige Bewässerung, da in diesem Monat die Niederschläge begrenzt sind und eine normale Bodenfeuchtigkeit für die richtige Ausfärbung und endgültige Reifung dieser Früchte notwendig ist. Darüber hinaus trägt die Bewässerung zu einer besseren Holzreife der Bäume und zur Anreicherung ausreichender Reservestoffe in ihrem Gewebe bei.

Die Massenernte spätreifender Obstbaumsorten beginnt. Es ist sehr wichtig, deren Pflückreife korrekt zu bestimmen. Seien Sie bei Äpfeln, Quitten und Birnen besonders vorsichtig. Ernten Sie sie, wenn die Hautfarbe klarer wird und die charakteristische Färbung der Sorte annimmt. Pflücken Sie die Früchte sorgfältig, um sie nicht zu verletzen und die kurzen fruchttragenden Zweige, die Fruchtknospen für die nächste Ernte tragen, nicht abzubrechen. Reife Birnen lösen sich leicht, aber es gibt Fälle, in denen sich die Früchte leicht lösen, bevor sie vollreif sind, und manchmal lösen sich sogar reife Früchte nicht leicht von den Zweigen. Es ist nützlich zu wissen, dass bei der Reifung von Birnen die Samen von hell- über dunkelbraun bis schwarz wechseln. Die Farbe der Samen ist einer der wichtigsten Indikatoren für die korrekte Bestimmung des Erntezeitpunkts. Die Birnensorten, die Sie einlagern werden, müssen regelmäßig kontrolliert werden, da bereits eine einzige faule Frucht in der Lage ist, die gesamte Erzeugung zu infizieren. Wählen Sie für die Lagerung einwandfreie Früchte – gesund und ohne mechanische Beschädigungen. Am besten ordnen Sie sie auf Holzregalen an und lassen zwischen den einzelnen Früchten einen Abstand. Eine gute Wirkung wird auch erzielt, indem jede Frucht in Zeitungspapier eingewickelt wird.

Im September und Oktober wird die Pflege der Erdbeerpflanzungen mit regelmäßigem Hacken und 1–2 Bewässerungen fortgesetzt. Die Pflanzen bilden weiterhin Fruchtknospen, daher ist es sehr wichtig, dass die Bodenoberfläche frei von Unkraut ist und dass ausreichend Feuchtigkeit im Boden vorhanden ist.

In dieser Zeit sollten Himbeeren nicht bewässert werden, damit die neuen Triebe ausreifen und sich auf die Überwinterung vorbereiten können. Bei remontierenden Sorten, die auch im Sommer Früchte tragen, muss der Boden um sie herum nach jedem Regen oder jeder Bewässerung gelockert werden.

Die Ruten abgetragener Brombeeren werden bodennah abgeschnitten, was den jungen Ruten ermöglicht, sich zu kräftigen.