

Geeignete Bedingungen für das Pflanzen von Obstbäumen

Автор(и): Растителна защита
Дата: 29.11.2017 *Брой:* 11/2017



Bis Ende des Monats werden die agrometeorologischen Bedingungen von überdurchschnittlichen Temperaturen bestimmt sein. In den Feldgebieten des Landes werden die prognostizierten Werte der durchschnittlichen Tagestemperaturen das für die Entwicklung von Weizen, Gerste und Winterraps erforderliche biologische Minimum deutlich überschreiten. Das für die Jahreszeit erwartete milde Wetter wird die Herbstvegetation der Wintergetreide und des Winterrapses verlängern und eine Voraussetzung für Fortschritte in der Entwicklung der spät gesäten Novemberbestände sein.

Rückgang und Einstellung der Vegetation bei Herbstkulturen

Bis zum 30. November ist ein Rückgang und eine Normalisierung der Temperaturverhältnisse prognostiziert, was zu einem Rückgang und in den höheren Lagen zu einem Erliegen der Vegetation bei den Herbstkulturen führen wird. Ende der dritten Dekade werden Weizen und Gerste, die innerhalb des agrotechnischen Zeitrahmens gesät wurden, überwiegend im Bestockungsstadium sein. Das Dreiblattstadium wird in Beständen vorherrschen, die Anfang November gesät wurden, und das Auflaufstadium in denen, die Mitte des Monats gesät wurden. In einem großen Teil der Rapsbestände wird das Rosettenstadium (6–7 Blätter) zu beobachten sein. An einigen Orten in den südöstlichen Regionen (Landwirtschaftsstation Sliven) hat die Höhe der Rapsbestände 25–27 cm erreicht und die Rosette 7–8 Blätter.

Ende des Monats wird es geeignete Bedingungen für die Pflanzung von Obstbäumen und für die Durchführung der herbstlichen Pflanzenschutzspritzungen in den Obstanlagen geben.

Quelle: NIMH-BAS