

Lockigkeit beim Pfirsich

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.02.2019 Брой: 2/2019



Erreger: *Taphrina deformans* – Pilz

Wirte: Pfirsich, Nektarine, Aprikose

Symptome:

Einzelne oder mehrere, blassgrüne, blassgelbe oder scharlachrote Schwellungen auf der Blattoberseite, die auf der Unterseite eingesenkt sind. Das Gewebe ist verdickt, rau und wellenförmig gekräuselt;

Der Befall kann die gesamte Blattspreite erfassen, wodurch die Blätter nekrotisch werden und abfallen.

Auf den befallenen Geweben bildet sich ein weißlicher Belag;

Schwellungen können auch an Trieben und Früchten auftreten.

Lebenszyklus

Der Erreger überwintert als Ascosporen zwischen den Knospenschuppen oder auf der Rinde befallener Triebe.

Die Infektionen erfolgen im zeitigen Frühjahr mit dem Knospenaufbruch der Blattknospen.

Bekämpfung:

Herbst-Winter Spritzungen. Wurde die Herbstspritzung versäumt, kann eine Behandlung bis zum

Knospenschwellen mit 1%iger Bordeauxbrühe durchgeführt werden, die auch gegen die Erreger der

Blütenfäule (Frühform der Monilia-Fruchtfäule) und der Schrotschusskrankheit bei Steinobst wirksam ist.