

Aktivierung der Vegetation in Herbstkulturen und mehrjährigen Plantagen

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.03.2018 Брой: 3/2018



Mitte März werden die agrometeorologischen Bedingungen von überdurchschnittlichen Temperaturen bestimmt sein. Das prognostizierte wärmere als jahreszeitlich übliche Wetter am Ende der ersten und zu Beginn der zweiten Märzdekade wird die Vegetation der herbstaugesäten Kulturen und der mehrjährigen Plantagen aktivieren. In dieser Zeit wird bei Wintergetreidekulturen mit Massenbestockung ein Anstieg des Bestockungskoeffizienten zu beobachten sein. Bei Obstbäumen werden verschiedene Phasen auftreten – von Knospenschwellen und Knospenaufbruch bis zum Blütenknospenstadium und der Blüte bei einigen Steinobstarten (Mandel, Aprikose, Pfirsich), hauptsächlich in den südlichen Regionen des Landes.

Am Ende des Zeitraums wird ein Temperaturrückgang prognostiziert, doch deren durchschnittliche Tageswerte werden das für die Vegetation von Weizen, Gerste und Winterraps erforderliche biologische Minimum deutlich überschreiten.

Zu Beginn des Zeitraums werden Bedingungen für die Durchführung von Vorbegrünungsspritzungen in Obstplantagen gegen eine Reihe von Krankheiten – Blütenfäule (Frühbraunfäule), Schrotschusskrankheit, Schorf usw. – gegeben sein.