

Die Blütezeit-Spritzung ist ein wichtiges Element in der Pflanzenschutzkette bei Obstkulturen.

Автор(и): проф.д-р Мария Боровинова, Институт по земеделие в Кюстендил; проф. д.с.н Иванка Лечева

Дата: 10.04.2018 *Брой:* 4/2018



Beim **Apfel** wird im April die Blütespritzung durchgeführt, die für den Schutz der Blüten vor Schorf sehr wichtig ist. In Jahren mit häufigen Niederschlägen und hoher Luftfeuchtigkeit kommt es bei anfälligen Sorten zu Masseninfektionen mit Schorf, wodurch die Blüten abfallen. Dieser Schaden bleibt sehr oft unbemerkt und die Erzeuger führen ihn auf andere Ursachen zurück. Diese Spritzung richtet sich auch gegen Mehltau und Monilia-Fruchtfäule.

Für die Blütespritzung wird eines der folgenden Fungizide verwendet: Luna Experience – 20-75 ml/da, Systhane Super 24EC – 0,03%, Strobi DF – 0,02%, Flint Max 75 WP – 0,02%, Chorus 50 WP – 0,03%, Shavit 72,5 WDG – 0,2% oder die Kombination Strobi DF – 0,02% + Delan 700 WDG – 0,035%.

Die Blütespritzung bei der **Birne** richtet sich gegen Schorf und Monilia-Fruchtfäule, wobei die für die Blütespritzung beim Apfel angegebenen Fungizide verwendet werden.

Bei allen **Steinobstarten** wird die Blütespritzung üblicherweise im April zur Bekämpfung der Monilia-Fruchtfäule durchgeführt. Wirksame Fungizide gegen diese Krankheit sind: Luna Experience – 20-75 ml/da, Chorus 50 WP – 0,045%, Signum WG – 30 g/da, Sifcar 250 EC – 20 ml/da, Delan 700 WDG – 0,05%, Thiram 80 WG – 0,3%.

Die meisten in unserem Land angebauten **Aprikosen- und Sauerkirschsorten** sind anfällig für Monilia-Fruchtfäule, und in einem feuchten Frühjahr mit langer Blütezeit sollten zwei Blütespritzungen durchgeführt werden. Die erste – zu Beginn der Blüte und die zweite – 8-10 Tage nach der ersten.

Blütespritzungen sollten morgens durchgeführt werden, wenn kein Bienenflug stattfindet. Die verwendeten Fungizide sind für Bienen nicht giftig, aber sie müssen während der Behandlung vor dem Sprühstrahl und vor einer Kontamination mit Fungiziden geschützt werden.

Den vollständigen Kalender für Blütespritzungen im April finden Sie in Ausgabe 3 der Zeitschrift „Pflanzenschutz“, die am 11.04.2018 erscheint.