

Günstige agrometeorologische Bedingungen

Автор(и): Растителна защита
Дата: 24.04.2018 Брой: 4/2018



Im dritten Aprildekad werden die agrometeorologischen Bedingungen durch Temperaturen über den klimatologischen Normen bestimmt. Bis zur Mitte der Dekade werden sich die Wintergetreidebestände überwiegend im Stadium des Schossens befinden. In einigen Gebieten Südbulgariens werden Weizen und Gerste vom Schossen in das Ährenschieben übergehen, und der Beginn des Ährenschiebens wird beobachtet. In dieser Zeit sollten Weizenbestände auf das Auftreten und die Populationsdichte eines der wichtigsten Schädlinge – der Getreidewanze – sowie auf die Entwicklung bestimmter Pilzkrankheiten – Septoria-Blattdürre, Braunrost und Echter Mehltau – überwacht werden.

Winterraps wird überwiegend in der Blütephase sein. In Sonnenblumenbeständen, die Ende der ersten Aprildekade gesät wurden, werden in einigen Gebieten der Donauebene – Băzovec, Novachene, Pavlikeni –

Auflaufen und das Anfangsstadium der Blattbildung stattfinden. In den Weinbergen werden die Stadien 1–3 Blätter beobachtet, und in den südlichen Regionen zusätzlich die Gescheinsstreckung. In dieser Zeit muss die erste vorbeugende Behandlung gegen Echten Mehltau (*Oidium*) durchgeführt werden. Günstigere Bedingungen für die Durchführung von Pflanzenschutzspritzungen werden in der ersten Hälfte der Dekade auftreten.

Bis zur Mitte der dritten Dekade sind keine nennenswerten Niederschläge zu erwarten. In den meisten Feldregionen werden die Bedingungen Bodenbearbeitung und die stark verspätete, über die agrotechnischen Fristen hinausgeschobene Aussaat von Sonnenblumen zulassen. Die Bodentemperaturen in 10 cm Tiefe haben geeignete Werte für die Aussaat von Körnermais, und bis zum Ende der folgenden Dekade werden sie auch für die Aussaat wärmeliebender Sommerkulturen (Baumwolle, Bohnen, Erdnüsse, Wassermelonen, Melonen) geeignet sein.

Quelle: NIMH