

Warmes und trockenes Wetter wird Ende April und Anfang Mai erwartet

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.04.2018 *Брой:* 4/2018



Ende April und Anfang Mai wird die Entwicklung der landwirtschaftlichen Kulturen bei überdurchschnittlichen Temperaturen verlaufen, und in einigen Gebieten des zentralen Teils der Donauebene sowie in den südlichen Regionen des Landes – auch bei unzureichenden Feuchtigkeitsreserven in der 50-cm-Bodenschicht. Infolge der hohen Temperaturen im April, der unterdurchschnittlichen Niederschläge und der beschleunigten Vegetation der Kulturen ist der Gehalt an Bodenfeuchtigkeit deutlich zurückgegangen, stellenweise auf unter 65 % der Feldkapazität.

Weizen und Gerste werden in den meisten Feldregionen in das Ährenschieben eintreten. In einigen Gebieten Südbulgariens wird auch in einem Teil der Bestände die Blüte beobachtet werden.

Winterraps wird überwiegend in der Blüte stehen. In den ausgesäten Beständen von Sonnenblume und Mais werden Auflaufen und das Anfangsstadium der Blattbildung zu beobachten sein. In dieser Periode verursacht der **Graue Rüsselkäfer** ernsthafte Schäden an Mais und Sonnenblume. Wenn die Schädlingsdichte die wirtschaftliche Schadensschwelle überschreitet (im Auflaufstadium, ETS > 2 Käfer pro m²), ist eine Behandlung zwingend erforderlich.

Während des Zeitraums wird in Weinbergen das Abspreizen der Traubenanlagen beobachtet. In dieser Phase tritt die schädliche Aktivität eines der gefährlichsten Schädlinge auf – der **Einbindige Traubenwickler**. Die Larven der ersten Generation des Wicklers schädigen die Blütenstände, was bei erhöhtem Auftreten (ETS > 6-8 Larven pro 100 Blütenstände) eine rechtzeitige Behandlung erfordert. Günstigere Bedingungen für die Durchführung von Pflanzenschutzspritzungen werden in der Mitte des Zeitraums auftreten.

Für Ende April und Anfang Mai sind keine kritischen Minimaltemperaturen für landwirtschaftliche Kulturen vorhergesagt.

Quelle: NIMH