

Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Pilzkrankheiten Mitte Mai

Автор(и): Растителна защита
Дата: 15.05.2018 Брой: 5/2018



Die prognostizierten Temperaturen und häufigen Niederschläge in diesem Zeitraum werden Bedingungen für eine Infektion und die Entwicklung von Pilzkrankheiten schaffen, wie z.B.: Schorf bei Kernobst, Schrotschusskrankheit und Fröhfäule bei Steinobst, Grauschimmel bei Erdbeeren, Falscher Mehltau bei Weinreben usw.

Mitte Mai werden die agrometeorologischen Bedingungen durch wechselhaftes Wetter und Temperaturen nahe der klimatischen Norm für die zweite Maidekade bestimmt.

Die erwarteten Niederschläge in diesem Zeitraum werden die Bodenfeuchtereserven in der 50-cm-Schicht und die Bedingungen für die Entwicklung der herbstgesäten Kulturen und der gesäten Frühjahrskulturen verbessern. Die Niederschläge Ende der ersten Maidekade waren ungleichmäßig verteilt. An einigen Stellen in den Feldgebieten lagen die Niederschläge unter 10 l/m², ohne besondere wirtschaftliche Bedeutung. Signifikante Mengen über 25-30 l/m² wurden in Teilen der Donauebene und in Ostbulgarien gemessen. In der Region Stara Sagora verursachte starker Regen über 50 l/m² Lagerbildung bei einem Teil der Bestände von Wintergetreide.

In diesem Zeitraum wird bei Sonnenblumen und Mais die Blattbildung erfolgen. Bei Wintergetreide finden Blüte, Befruchtung, Kornbildung und Kornfüllung statt. Ende der zweiten Dekade werden einige Gersten- und Weizenbestände in den südlichen Regionen in den Beginn der Milchreife eintreten, früher als die üblichen Termine für das Land. Winterraps befindet sich im reproduktiven Entwicklungsstadium.

Die prognostizierten Temperaturen und häufigen Niederschläge in diesem Zeitraum werden Bedingungen für eine Infektion und die Entwicklung von Pilzkrankheiten schaffen, wie z.B.: Schorf bei Kernobst, Schrotschusskrankheit und Frühfäule bei Steinobst, Grauschimmel bei Erdbeeren, Falscher Mehltau bei Weinreben usw.

In der zweiten Maidekade wird bei frühen Kirscharten das Reifestadium beobachtet. In dieser Zeit verursacht die Kirschfruchtfliege Schäden bei mittelfrühen Sorten. Eine Insektizidbehandlung gegen diesen Schädling sollte zu Beginn der Einfärbung der Kirschfrüchte durchgeführt werden.

Quelle: NIMH