

Zeit für die Ernte der Herbstkulturen

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.06.2018 Брой: 6/2018



An den meisten Tagen im Juni werden die agrometeorologischen Bedingungen durch wechselhaftes Wetter bestimmt. Die erwarteten Niederschläge im größten Teil der Ackerbauregionen des Landes, etwa in Höhe der Monatsnorm, werden gute Bodenfeuchtereserven in den 50-cm- und 100-cm-Schichten aufrechterhalten – bei etwa und über 70 % der Feldkapazität (FK). Niedrigere Feuchtereserven werden für Nordostbulgarien (Razgrad, Russe, Silistra, Dobritsch) und die südwestlichen Regionen (Blagoewgrad) prognostiziert, wo die Niederschläge im Mai deutlich unter der Monatsnorm lagen.

In der ersten Junidekade werden die prognostizierten überdurchschnittlichen Temperaturen die Endstadien der Entwicklung der herbstausgesäten Kulturen beschleunigen. Winterraps wird sich im Reifestadium befinden. Bei den Wintergetreidekulturen auf den höher gelegenen Feldern werden Kornfüllung und das Milchreifestadium

stattfinden. In den Ackerbauregionen wird der Weizen von der Milch- in die Teig- und Teigreife übergehen. Bei Gerste werden Teig- und Vollreife beobachtet.

In der zweiten Dekade werden die agrometeorologischen Bedingungen durch Temperaturen nahe dem Üblichen für diesen Zeitraum bestimmt. Bis Mitte Juni wird bei Weizen ein Massenreifestadium zu beobachten sein.

In der dritten Dekade werden die prognostizierten überdurchschnittlichen thermischen Bedingungen die Vegetation der landwirtschaftlichen Kulturen beschleunigen. Bis Monatsende werden Teile der Sommerkulturen in die generative Phase ihrer Entwicklung eintreten: in den früher ausgesäten Sonnenblumenbeständen wird der Blühbeginn beobachtet, und bei den frühen Maishybriden – das Fahren- und Fahrenblühen.

Die prognostizierten Höchsttemperaturen im Juni, örtlich bis zu 35-36°C, werden sich kurzfristig negativ auf Blüte und Befruchtung bei Feld- und Gemüsekulturen auswirken.

Häufige Niederschläge in der ersten Monatshälfte und die erwarteten Hagelgewitter halten ein hohes Risiko für die Entwicklung von Pilzkrankheiten aufrecht: Falscher Mehltau in Weinbergen und Gemüsekulturen (Kraut- und Braunfäule bei Tomaten), Schorf und Späte Braunfäule am Obst in Obstanlagen.

Günstigere Bedingungen für die Durchführung von Pflanzenschutzspritzungen werden gegen Ende der ersten, in der Mitte der zweiten und an den meisten Tagen der dritten Junidekade auftreten.

Quelle: NIMH