

Ende August und Anfang September ist das Wetter für die Sonnenblumenernte geeignet.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 31.08.2018 Брой: 8/2018



Während des nächsten Siebentageszeitraums (31.08.-05.09.2018) wird die Entwicklung der späten landwirtschaftlichen Kulturen bei überdurchschnittlichen Temperaturbedingungen beschleunigt voranschreiten. Anfang September werden auch die Sonnenblumenbestände auf den höher gelegenen Feldern ihre Entwicklung abschließen. Bei mittelspäten Maishybriden wird die Wachsreife und Vollreife weit verbreitet zu beobachten sein, während bei späten Hybriden die Milchreife und der Übergang von der Milch- zur Wachsreife stattfinden.

Zu Beginn des Zeitraums ist in den Feldgebieten des Landes trockenes Wetter zu erwarten, was geeignete Bedingungen für die Ernte von Sonnenblumen und für die Räumung der mit früheren Maishybriden bestellten Flächen schafft.

In der zweiten Hälfte des Zeitraums werden sich die agrometeorologischen Bedingungen ändern, deutlicher in Westbulgarien. Es sind Niederschläge vorhergesagt und eine Verbesserung der Wasservorräte in den oberen Bodenschichten, was eine Voraussetzung für eine qualitativ hochwertigere Tiefenlockerung und für die Vorsaatbearbeitung der für die Aussaat von Winterraps vorgesehenen Flächen sein wird. Die kleinen Samen des Rapses erfordern eine sehr gute, nahezu gartenähnliche, Vorsaatvorbereitung der Felder. Die Niederschläge Ende August, nach der sich verstärkenden Trockenheit, waren lokal und nur an bestimmten Orten in Nordbulgarien (Plewen, Lowetsch, Swischtow) und in der Oberthrakischen Tiefebene (Plowdiw) von wirtschaftlicher Wirkung. Der optimale agrotechnische Zeitrahmen für die Aussaat von Winterraps ist bis Mitte September.

Der Zeitraum ist geeignet für die Aussaat von Spinat für die Herbstproduktion.

Quelle: NIMH