

Ende November werden die agrometeorologischen Bedingungen durch eine erhöhte Dynamik gekennzeichnet sein.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 26.11.2018 Брой: 11/2018



Nach der anhaltenden Herbsttrockenheit führten die Niederschläge in Form von Regen und Schnee Ende der zweiten und Anfang der dritten Novemberdekade, die in vielen Landesteilen 40-50 l/m² überschritten (Razgrad-57 l/m², Shumen-57 l/m², Ruse-60 l/m², Haskovo-50 l/m², Kardzhali-50 l/m², Chirpan-65 l/m², Stara Zagora-60 l/m², Sliven-59 l/m²), zum Ausgleich des Feuchtigkeitsdefizits in den oberen Bodenschichten der herbstgesäten Kulturen. Dieser Niederschlag kommt für einen Teil der Wintergetreidekulturen zu spät, die sich aufgrund des Feuchtigkeitsmangels in einem Anfangsstadium ihrer Vegetation befinden und deren erfolgreiche Überwinterung infrage stellt.

Während der nächsten Siebentagesperiode werden die agrometeorologischen Bedingungen durch eine erhöhte Dynamik gekennzeichnet sein. Zu Beginn und am Ende des Zeitraums liegen die prognostizierten Werte der durchschnittlichen Tagestemperaturen für den größten Teil des Landes, mit Ausnahme der südlichen Regionen, unter dem für die Vegetation von Weizen, Gerste und Winterraps erforderlichen biologischen Minimum. Ende November werden die herbstgesäten Kulturen in Nordbulgarien, wo auch Schneefall erwartet wird, in einen Zustand der relativen Ruhe eintreten.

In Südbulgarien wird die Vegetation der Wintergetreidekulturen und des Winterrapses verlangsamt verlaufen, und eine wesentliche Veränderung in der phänologischen Entwicklung der Kulturen ist nicht zu erwarten.

Ende November werden bei Weizen und Gerste folgende Wachstumsstadien beobachtet: Auflaufen, drittes Blatt und Beginn der Bestockung, hauptsächlich in den Beständen im zentralen und nordöstlichen Teil der Donauebene.

Beim Raps wird das 4-5 Blatt-Stadium vorherrschen. Ein kleiner Teil der zu Herbstbeginn gesäten Bestände befindet sich am Anfang des Rosettenbildungsstadiums (6. Blatt).

Während des Zeitraums werden Mitte der dritten Novemberdekade günstigere Bedingungen für den Abschluss der Herbstpflanzung von Obstbäumen auftreten.

Quelle: NIMH