

Phytosanitärer Status der landwirtschaftlichen Kulturen zum 01.09 Tabak

Автор(и): БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните

Дата: 30.10.2014 Брой: 10/2014



In den ersten Augusttagen blieben die agrometeorologischen Bedingungen in Westbulgarien instabil. Dies behinderte die Weizenernte weiter und verschlechterte die Qualität des Getreides. Bis Ende des Monats war die Weizenernte in den höher gelegenen Gebieten der Bezirke Kyustendil, Pernik und Sofia immer noch nicht abgeschlossen. Mitte August stabilisierte sich die Atmosphäre, die Temperaturen stiegen und in verschiedenen Landesteilen erreichten die Maxima zwischen 33-38°C.

In der zweiten Augushälfte beendeten einige der Sommerkulturen ihre Entwicklung. Die Sonnenblumenernte und die Aussaat von Raps begannen. In Südbulgarien, in Gebieten mit geringeren Niederschlägen während der Saison, begann auch die Ernte von frühem Hybridmais.

TABAK

Phänophase: "Ende der Ernte"

Im August blieb der phytosanitäre Zustand des Tabaks unverändert. Nur die Bildung von Kolonien der Tabakblattlaus an den oberen Blättern von 5-7% der Pflanzen in den Bezirken Blagoevgrad und Kardschali wurde festgestellt. In den Bezirken Kardschali, Plovdiv und Chaskowo wurden von 5 bis 7% der Pflanzen erfasst, die von Viruskrankheiten betroffen waren (Tabakätzvirus und Tomatenbronzefleckenvirus an Tabak). 117,8 Tausend Dekar wurden 1 bis 5 Mal behandelt.