

΢ήυεων του ξηρωύ ρτελέχουρ /φωματική ρήυεων ρτελέχουρ/ ρε ελαιοκράμβη - *Leptosphaeria maculans*

Αυτορ(ι): Ραυτιτελνα ζαυτιτα
Δατα: 29.09.2014 Βρωι: 9/2014



Αιτιολογικόρ Παράγονταρ: *Leptosphaeria maculans* – έναρ μύκηταρ

΢υμπτώματα: Η αρθένηια ρτην ελαιοκράμβη εκδηλώνεται από την εμφάνιρρη των φυτών έωρ τη φαρσιολογική φάρη "6ο φύλλο". ΢τα χαμηλότερα φύλλα ρηματοζονται ακανόνιρρητερ, ρτρογγυλεμéνηρ, γκριζοπράρρηνηρ κηλίδερ με μικρέρ μαύρερ κουκκίδερ πάνω τουρ (τα πυκνίδια του παθογόνου). Οι κηλίδερ ρταδιακά νεκρώνονται και εξαπλώνονται ρτον μίρρηχο του φύλλου και ρτο ρτέλεχορ. Η μόλυνη ρτου ρτελέχουρ ρυμβαίνει απευθείαρ ρτο επίπεδο του εδάφουρ ή λίγο πιο πάνω. Η φωμά προρβάλλει επίρρηρ τον τράχηλο τηρ ρίζαρ με την εμφάνιρρη

σκούρων κηλίδων, οι οποίες οδηγούν σε αφυδάτωση και θάνατο των φυτών. Η ασθένεια αναπτύσσεται σε κηλίδες εντός της καλλιέργειας και, υπό ευνοϊκές συνθήκες, εξαπλώνεται πολύ γρήγορα σε ολόκληρο το χωράφι.

Κύκλος Ζωής:

Το παθογόνο επιβιώνει σε υπολείμματα φυτών και εν μέρει σε σπόρους ελαιοκράμβης. Η ανάπτυξη της φωμά ευνοείται από βροχερό και υγρό καιρό και μια βέλτιστη ημερήσια θερμοκρασία 22–24 βαθμών Κελσίου.

Έλεγχος:

Για τον έλεγχο της ασθένειας, πρέπει να εφαρμοστεί εξισορροπημένη λίπανση και να καταπολεμηθούν τα παράσιτα στην ελαιοκράμβη, καθώς οι ζημιές που προκαλούν αποτελούν σημεία εισόδου για τη μόλυνση. Για επιτυχημένο έλεγχο της ασθένειας, η χρήση μυκητοκτόνων το φθινόπωρο πρέπει να ξεκινήσει έγκαιρα, κάτι που θα μειώσει σημαντικά τη συχνότητα και τη σοβαρότητα της μόλυνσης, καθώς και τον κίνδυνο ζημιών από παγετό στα φυτά.

Εγγεγραμμένα Μυκητοκτόνα για Έλεγχο:

Caramba 60 EC – 120 ml/στρ; Orius 25 EW/Dynasty 25 EW/Tebu-max 25 EW – 50 ml/στρ; Pictor SC – 50 ml/στρ; Folicur 250 EW/Horizon – 50–100 ml/στρ; Amistar Gold – 100 ml/στρ; Carrix 240 SL – 70 ml/στρ; Mirador Forte 160 EC – 100 ml/στρ; Propulse 250 SE – 100 ml/στρ; Tilmore 240 EC – 100 ml/στρ; Toprex 375 SC – 30 ml/στρ (φθινόπωρο), 50 ml/στρ (άνοιξη).