

Φροντίδα φυτοπροστασίας για το αμπέλι

Автор(и): Ραστίτελνα ζαχτίτα
Дата: 30.03.2019 Брой: 3/2019



Κύριοι εχθροί για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο

Εξκοριόζη της αμπέλου *Phomopsis viticola*

Ευρωπαϊκός ερυθρός ακάρεας *Panonychus ulmi*

Σταφυλόσκωρος *Lobesia botrana*

Εξκοριόζη της αμπέλου

Το αιτιολογικό παράγοντα της ασθένειας διαχειμάζει ως καρποφόρα σώματα στον φλοιό των ωριμασμένων βλαστών και ως μυκήλιο στους οφθαλμούς και το ξύλο. Η κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη της ασθένειας είναι από το στάδιο ανάπτυξης της αμπέλου «πρήξιμο οφθαλμών» έως το στάδιο «3ο–4ο φύλλο», σε συνδυασμό με μέτρια ζεστό καιρό και υγρασία αέρα πάνω από 98–100%. Τα συμπτώματα της ασθένειας εκδηλώνονται με το ξεράσιμο των πρωτευόντων οφθαλμών, την επιμήκυνση των βραχιόνων και το ξεράσιμό τους.

Στρατηγική καταπολέμησης

Η επεξεργασία με προϊόντα φυτοπροστασίας είναι υποχρεωτική εάν εντοπίστηκε η ασθένεια στα αμπέλια την προηγούμενη χρονιά. Μία μόνο ανεξάρτητη ψεκασμοθεραπεία πραγματοποιείται όταν περίπου το 40% των οφθαλμών που βρίσκονται στη βάση των βλαστών βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης «πράσινη κορυφή». Σε δροσερό και βροχερό άνοιμα, όταν η ευαίσθητη περίοδος για την εξκορίοξη παρατείνεται, πραγματοποιείται δεύτερη ψεκασμοθεραπεία όταν το 30–40% των οφθαλμών στη βάση των βλαστών βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης «2–3 φύλλα».

Εγκεκριμένα προϊόντα φυτοπροστασίας

Verita WG - 0,2%; Mikal Flash - 0,3%; Momentum Extra WG - 300 g/ha; Pencozeb 75 WG - 210 g/ha; Solofol - 188 g/ha; Thiovit Jet 80 WG - 1250 g/ha; Folder 80 WG - 187,5 g/ha; Follow 80 WG / Friller 80 WG / Flowet 80 WG - 187,5 g/ha; Delan 700 WDG - 0,2%; Kumulus DF - 750 g/ha.

Ευρωπαϊκός ερυθρός ακάρεας

Οι προνύμφες, οι νύμφες και οι ενήλικες ακάρεες προκαλούν ζημιά ρουφώντας χυμό και κόκκους χλωροφύλλης από τους αναπτυσσόμενους οφθαλμούς και από την κάτω πλευρά των φύλλων. Αποκρίνουν ένζυμα που διασπούν τις χρωστικές ουσίες στα φύλλα. Ως αποτέλεσμα της ζημιάς, το χρώμα της φυλλικής πλάκας αλλάζει ελαφρώς. Από απόσταση, τα φύλλα φαίνονται γκριζοκαφέ και έχουν προς τα πάνω στριμμένο χείλος.

Στρατηγική καταπολέμησης

Η ψεκασμοθεραπεία πραγματοποιείται μέχρι το στάδιο ανάπτυξης «πρήξιμο οφθαλμών» και στην αρχή της εκκόλαψης των αυγών.

Εγκεκριμένα προϊόντα φυτοπροστασίας

Para Sommer - 3%; Zoom 11SC - 12,55 ml/ha; Ovipron TOP EC – 2500–3500 ml/ha; Thiovit Jet 80 WG - 2000 g/ha.

Σταφυλόσκωρος

Η πτήση των πεταλούδων της διαχειμάσας γενιάς ξεκινά όταν η μέση ημερήσια θερμοκρασία του αέρα, για μια περίοδο περίπου δέκα ημερών, ανέβει πάνω από 10–12 °C.

Στρατηγική καταπολέμησης

Тон Μάρτιο και τον Απρίλιο, για την παρακολούθηση της πτήσης και του αριθμού των προσελκυόμενων πεταλούδων της πρώτης γενιάς του εχθρού, κρεμούνται φερομονικές παγίδες στο σύστημα περγολών στα αμπέλια (1 παγίδα ανά 25–30 εκτάρια αμπελώνων).