

Αγρομετεωρολογική πρόγνωση για τα μέσα Ιανουαρίου

Автор(и): Растителна защита
Дата: 13.01.2020 Брой: 1/2020



Η αναμενόμενη σχετικά ξηρά καιρική συνθήκη κατά την περίοδο θα είναι κατάλληλη για την εκτέλεση βαθύ άροσης και καλλιεργειών μεταξύ των σειρών σε αμπελώνες και οπωρώνες, οι οποίες καταστρέφουν ένα μεγάλο μέρος των σταδίων διαχείμασης πολυάριθμων εχθρών (σκαθάρια, νυχτοπεταλούδες, σφηκίδες οπωροφόρων κ.λπ.). Οι προβλεπόμενες θετικές ημερήσιες θερμοκρασίες θα επιτρέψουν την εκτέλεση χειμερινών ψεκασμών φυτοπροστασίας σε οπωρώνες.

Στις αρχές Ιανουαρίου, σε ορισμένες τοποθεσίες στη Δυτική Βουλγαρία (Βίντιν, Κνέζα, Ντραγκόμαν, Σόφια, Κουουστένιτλ) και στη Θρακική Πεδιάδα (Πλόβντιβ, Τσέρπαν), καταγράφηκαν ελάχιστες θερμοκρασίες περίπου μείον 10-11°C. Αυτές οι τιμές, σε συνθήκες χωρίς χιονοκάλυψη και με πιο παρατεταμένη διάρκεια, είναι

епικίνδυνες για τα όψιμα χειμερινά καλλιέργειες που διαχειμάζουν σε στάδια βλάστησης και αρχικής ανάπτυξης φύλλων.

Μετά το σύντομο κύμα ψύχους, κατά την επόμενη περίοδο οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες θα υποστούν αλλαγή. Πάνω από το κανονικό θερμοκρασίες προβλέπονται μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, αλλά οι μέσες ημερήσιες τιμές τους θα παραμείνουν κάτω από το βιολογικό ελάχιστο που απαιτείται για την επαναφορά των βλαστικών διεργασιών σε χειμερινές δημητριακές καλλιέργειες, και οι φυτώσεις θα παραμείνουν σε κατάσταση αδράνειας.

Δεν προβλέπεται σημαντική βροχόπτωση κατά την περίοδο, και το επίπεδο των αποθεμάτων υγρασίας του εδάφους σε χειμερινές δημητριακές καλλιέργειες στα στρώματα των 50 και 100 cm θα παραμείνει ασυνήθιστα χαμηλό για την εποχή – σε ορισμένες ανατολικές περιοχές κάτω από το 60% της χωρητικότητας πεδίου. Στις αρχές του χειμώνα, σε χρόνια χωρίς φθινοπωρινή ξηρασία, τα αποθέματα υγρασίας του εδάφους στο στρώμα των 100 cm συνήθως φτάνουν σε επίπεδα κοντά στη χωρητικότητα πεδίου.

Η αναμενόμενη σχετικά ξηρά καιρική συνθήκη κατά την περίοδο θα είναι κατάλληλη για την εκτέλεση βαθύ άροσης και καλλιεργειών μεταξύ των σειρών σε αμπελώνες και οπωρώνες, οι οποίες καταστρέφουν ένα μεγάλο μέρος των σταδίων διαχείμασης πολυάριθμων εχθρών (σκαθάρια, νυχτοπεταλούδες, σφηκίδες οπωροφόρων κ.λπ.). Οι προβλεπόμενες θετικές ημερήσιες θερμοκρασίες θα επιτρέψουν την εκτέλεση χειμερινών ψεκασμών φυτοπροστασίας σε οπωρώνες.

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Υδρολογίας (NIMH)