

Δύσκολες δραστηριότητες φυτοπροστασίας στα μέσα Μαρτίου

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.03.2020 Брой: 3/2020



Στις αρχές Μαρτίου, έπεσαν βροχοπτώσεις μεταξύ 20 – 40 l/m² στη Δυτική και Κεντρική Βουλγαρία, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των αποθεμάτων υγρασίας του εδάφους στο στρώμα των 50 cm και 100 cm στις γεωργικές καλλιέργειες.

Στα μέσα Μαρτίου, οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες θα καθοριστούν από μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες γύρω και πάνω από το βιολογικό ελάχιστο των υπερχειμαζόντων γεωργικών καλλιεργειών. Οι βλαστικές τους διαδικασίες θα προχωρήσουν με φυσιολογικούς ρυθμούς. Οι προβλεπόμενες βροχοπτώσεις κατά το πρώτο μισό της περιόδου, και πάλι πιο σημαντικές σε ποσότητα στη Νοτιοδυτική και Κεντρική Βουλγαρία, θα ευνοήσουν την αύξηση των αποθεμάτων υγρασίας στο στρώμα του εδάφους του ενός μέτρου.

Κατά την περίοδο, το σιτάρι θα βρίσκεται στο στάδιο της μαζικής αποβλάστησης και θα παρατηρηθεί αύξηση του συντελεστή αποβλάστησης. Θα συμβεί διακλάδωση στην ελαιοκράμβη. Στα οπωροφόρα είδη, θα λάβει χώρα πρήξιμο και ρήγμα των μπουμποκιών, και σε ορισμένα κουκουλοφόρα (ροδάκινο, βερίκοκο) στην Κεντρική και Ανατολική Βουλγαρία, θα συμβεί επίσης το στάδιο της άνθησης. Κατά την περίοδο, αρχίζει το αγροτεχνικό χρονικό παράθυρο για τη σπορά του ηλιοτρόπιο στη Νότια Βουλγαρία.

Οι προβλεπόμενες βροχοπτώσεις σε πολλά σημεία στις πεδινές περιοχές θα εμποδίσουν την εκτέλεση ποιοτικής καλλιέργειας του εδάφους και την υλοποίηση δραστηριοτήτων φυτοπροστασίας.

Πηγή EIBM