

Πώς να επιτύχετε όχι μόνο υψηλότερες, αλλά και υψηλότερης ποιότητας αποδόσεις σε ηλίανθο και καλαμπόκι;

Автор(и): Растителна защита
Дата: 24.04.2020 Брой: 4/2020



Στις δύσκολες σημερινές εποχές, κάθε αγροτικός παραγωγός αντιμετωπίζει την πρόκληση του πώς να αυξήσει την απόδοση και την ποιότητα της παραγωγής του ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τη γονιμότητα του εδάφους. Η απάντηση είναι μία – η χρήση του μοναδικά σκευασμένου βιοδιεγέρτη **Amalgerol Essence**, που δρα ταυτόχρονα στο έδαφος, στις ρίζες και στα φυτά.

Ηλίανθος

Βασισμένοι σε πολυετείς δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε Βουλγαρικά ινστιτούτα και την εμπειρία αγροτών που έχουν εμπιστευτεί το **Amalgerol Essence**, παρατηρούμε τα ακόλουθα αποτελέσματα στον ηλίανθο:

- Το επίπεδο **περιεκτικότητας σε λάδι** με τυπική τεχνολογία είναι 42–45%.
- Με την εφαρμογή τυπικής τεχνολογίας σε συνδυασμό με το **Amalgerol Essence** η περιεκτικότητα σε λάδι αυξάνεται στο 46–48%.

Η αξία των αποτελεσμάτων εξαρτάται επίσης από τον ενσωματωμένο δυναμικό του υβριδίου.

Συμβαίνει όλο και πιο συχνά οι έμποροι ηλίανθου να παρέχουν πρόσθετη αμοιβή για υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι, και η παραγωγή με υψηλότερη περιεκτικότητα σε λάδι να αγοράζεται σε υψηλότερη τιμή. Αυτό το παρατηρήσαμε πρώτα σε εταιρείες εξαγωγών, και τώρα οι Βουλγαρικοί ελαιοτριβεία ακολουθούν το παράδειγμά τους.

Υπάρχουν ειδικά υβρίδια στην αγορά – **υβρίδια ηλίανθου υψηλής σε ελαϊκό οξύ περιεκτικότητας**, για τα οποία απαιτείται ελάχιστη περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ 80%. Η πράξη δείχνει ότι τα υβρίδια υψηλής σε ελαϊκό οξύ περιεκτικότητας που υποβάλλονται σε τυπική τεχνολογία σε συνδυασμό με **Amalgerol Essence** έχουν περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ 88–90% και αγοράζονται σε υψηλότερη τιμή.

Για την απόδοση του ηλίανθου μετά τη χρήση του **Amalgerol Essence** καταγράφουμε αύξηση **10–15%**, ανάλογα με το αν τα φυτά υποβάλλονται σε μία ή δύο επεμβάσεις. Εφαρμογή:

- πρώτη επέμβαση στο στάδιο ανάπτυξης του 2ου–4ου ζεύγους φύλλων.
- δεύτερη επέμβαση στην αρχή του σταδίου της μπουμπούκωσης πριν από το κλείσιμο των σειρών (συνήθως σε συνδυασμό με προϊόντα για τον έλεγχο του Johnsongrass).

Η συνιστώμενη δόση είναι 200 ml/στρέμμα.

Καλαμπόκι

Το **Amalgerol Essence** παρέχει επίσης εξαιρετικά αποτελέσματα στο **καλαμπόκι**, με μία ή δύο εφαρμογές ανάλογα με την τεχνολογία καλλιέργειας του παραγωγού:

- Η πρώτη επέμβαση πραγματοποιείται μαζί με την εφαρμογή ζιζανιοκτόνων κατά του Johnsongrass και άλλων γρασιδιών. Σε περίπτωση ανομβρίας την άνοιξη, η επέμβαση με **Amalgerol Essence** επιτρέπει στο

καλαμπόκι να αντιμετωπίσει το στρες και να ξεπεράσει την ξηρασία με ελάχιστες ζημιές χάρη στους αντιοξειδωτικούς παράγοντες που περιέχει το προϊόν. Εάν συμβεί περίοδος ξηρασίας την άνοιξη και το καλαμπόκι δεν έχει υποβληθεί σε επέμβαση με **Amalgerol Essence**, συνιστούμε άμεση επέμβαση πριν από το τυλίξιμο των φύλλων.

- Συνιστάται η δεύτερη επέμβαση με **Amalgerol Essence** να γίνει στα τέλη Ιουνίου στο στάδιο του 16ου φύλλου (ανθοφορία) κατά τη φυλλωρή εφαρμογή υγρού προϊόντος αζώτου (με χαμηλή περιεκτικότητα σε βιουρέτη).

Μέσω της δεύτερης επέμβασης, το καλαμπόκι ανέχεται πιο αποτελεσματικά τις ξηρασίες που παραδοσιακά αναμένονται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και οι αποδόσεις είναι **15–20%** υψηλότερες (ακόμη περισσότερο σε ορισμένες περιπτώσεις). Η δόση εφαρμογής είναι 200 ml/στρέμμα.

Συνιστούμε να πραγματοποιηθεί η πρώτη επέμβαση με **Amalgerol Essence** στον ηλίανθο και το καλαμπόκι, καθώς επηρεάζει το σχηματισμό ενός ισχυρότερου ριζικού συστήματος και μιας καλύτερα αναπτυγμένης φυλλικής μάζας.

Βίντεο: <https://www.youtube.com/watch?v=3ivXtDzW5S4>

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε: https://www.mediplusr.com/amalgerol_essence/