


Στα τέλη Μαΐου – βροχόπτωση γεωργικού ενδιαφέροντος στις ανατολικές περιοχές της χώρας

Автор(и): Растителна защита

Дата: 21.05.2021 Брой: 5/2021



Κατά την περασμένη επταήμερη περίοδο, στο μεγαλύτερο μέρος των αγροτικών περιοχών, με εξαίρεση ορισμένες τοποθεσίες στην Ανατολική Βουλγαρία, έπεσε οικονομικά σημαντική βροχόπτωση πάνω από 20–25 λ/μ2. Σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Βουλγαρίας – Κνεζά, Οριάχοβο, Λομ – τα ποσά ξεπέρασαν τα 40 λ/μ2 και βελτίωσαν την υγρασία του εδάφους και τις συνθήκες για την ανάπτυξη των γεωργικών καλλιεργειών.

Στην αρχή της επόμενης περιόδου, προβλέπεται και πάλι περαιτέρω βροχόπτωση, πιο σημαντική σε ποσότητα στις ανατολικές περιοχές της χώρας, όπου αναμένεται βελτίωση των αποθεμάτων υγρασίας του εδάφους στο

στρώμα των 50 cm. Οι βλαστικές διαδικασίες στα χειμερινά και ανοιξιάτικα καλλιώματα θα προχωρήσουν με φυσιολογικούς ρυθμούς υπό θερμοκρασίες γύρω και πάνω από το κανονικό και με καλή παροχή υγρασίας. Στο σιτάρι, θα συμβούν οι φάσεις της άνθησης, της γονιμοποίησης και του σχηματισμού του κόκκου, και στην κριθάρι στις νότιες περιοχές, η έναρξη του σταδίου της γαλακτώδους ωρίμανσης επίσης. Στην χειμερινή ελαιοκράμβη, θα πραγματοποιηθεί ο σχηματισμός λοβών και σπόρων. Στο καλαμπόκι και τον ηλίανθο, θα συνεχιστεί η διαδικασία σχηματισμού φύλλων. Στην αμπέλου, θα συμβεί μαζικός διαχωρισμός ταξιανθιών. Στα σπωροφόρα είδη, θα παρατηρηθεί μεγέθυνση του καρπού.

Συνθήκες για τη διεξαγωγή ψεκασμού φυτοπροστασίας κατά του ψευδοπερονόσπορου σε λαχανικά και αμπέλου, και της καφέ σήψης στα πυρηνόκαρπα είδη θα εμφανιστούν στο μέσο της περιόδου. Τα σπωροφόρα δέντρα που επηρεάστηκαν από χαλάζι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μυκητοκτόνα που περιέχουν χαλκό για να περιοριστεί η ανάπτυξη μυκητιακών ασθενειών.

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Υδρολογίας (NIMH)