

## 'Στο οπωροφόρο κήπο'

Автор(и): проф. Мария Боровинова

Дата: 01.02.2015 Брой: 2/2015



Κατά τις ζεστές μέρες του Φεβρουαρίου και του πρώτου δεκαπενθήμερου του Μαρτίου, πρέπει να πραγματοποιείται ψεκασμός κατά του διαχειμάζοντος αποθέματος: αυγών του ευρωπαϊκού ερυθρού ακάρεου, του καφέ ακάρεου της μηλιάς, του πράσινου αφιού της μηλιάς, του ροζ αφιού της μηλιάς, του αφιού της μηλιάς-γρασιδιού, του αφιού της αχλαδιάς-κλίμακας, του αφιού της αχλαδιάς-κολοκύθας, του μαύρου αφιού του κερασιού, του αλευρώδους αφιού του δαμάσκηνου, του πράσινου αφιού του ροδάκινου, του αφιού που συστρέφει τα φύλλα, του μεγάλου αφιού του ροδάκινου, του μικρού και μεγάλου αφιού του δαμάσκηνου, του μικρού χειμερινού σκώρου, του μεγάλου χειμερινού σκώρου, του ελιότρυπα του τριανταφυλλιού, του ελιότρυπα της κραταιγιάς, του καφέ-κηλιδωτού ελιότρυπα. προνύμφες της κλίμακας San Jose, της κίτρινης κλίμακας της αχλαδιάς, της ψευδούς κλίμακας San Jose, της κλίμακας κόμμα. Κατά αυτών των εντόμων σε μηλιά, αχλαδιά, κερασιά, βυσσινιά, βερικοκιά, ροδακινιά και δαμάσκηνο, χρησιμοποιείται το Para Zomer – 3%. Για ταυτόχρονο έλεγχο της συστροφής των φύλλων του ροδάκινου, της τράχης της

αχλαδιάς και του ροδάκινου, της νόσου των τρυπητών κηλίδων και της καφέ σήψης στα νοσήματα των πυρήνων, του βακτηριακού καρκίνου (γουμμόζης) σε κερασιά, βυσσινιά και βερικοκιά που προκαλείται από το *Pseudomonas syringae*, και της ευλογιάς του δαμάσκηνου (σάρκα) στο δαμάσκηνο, ένα από τα μυκητοκτόνα που περιέχουν χαλκό προστίθεται στο Para Zomer - Μείγμα Βορδό-1%, Funguran OH 50WP-0.3%, Champion WP- 0.3%, Kocide 101 WP-0.3%.

Στις αχλαδιές, θα πρέπει να παρακολουθείται η ανάπτυξη του κοινού ψύλλου της αχλαδιάς, συγκεκριμένα η εμφάνισή τους από τα χειμερινά καταφύγια και η διασπορά των διαχειμασμένων ενηλίκων σε πρησμένα μπουμπούκια, όπου αρχίζουν να απορροφούν χυμό. Σε υψηλή πυκνότητα του ψύλλου (1 άτομο ανά 10 σακουλιασμένα κλαδάκια), απαιτείται ψεκασμός κατά των ενηλίκων ατόμων πριν από την ωτοκία. Πολύ συχνά, η θεραπεία κατά αυτού του παράσιτου συμπίπτει με τη χειμερινή θεραπεία, και τότε ένα από τα ακόλουθα εντομοκτόνα προστίθεται στο Para Zomer: Vaztak Nov 100 EC – 0.02%, Decis 2.5 EC – 0.03%, Deca EC – 75 ml/da, Sumicidin 5EC – 0.03%. Σε κερασιές και βυσσινιές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πραγματοποιείται δοκιμή κούνησης για τον προσδιορισμό της πυκνότητας του σκαθαριού του κερασιού, και αν βρεθούν 3 ενήλικα ανά δέντρο, γίνεται ψεκασμός με Nurelle D/Sanmba/ – 0.08%.

Στην εικόνα: Συστροφή φύλλων ροδάκινου