

Στα τέλη Νοεμβρίου – κατάλληλες συνθήκες για φύτευση οπωροφόρων δέντρων

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.11.2022 Брой: 11/2022



Στο τέλος Νοεμβρίου αναμένεται σημαντική αλλαγή των αγρομετεωρολογικών συνθηκών. Κατά τις περισσότερες ημέρες της περιόδου, οι μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες θα είναι κάτω από τα κλιματικά κανονικά και κάτω από το βιολογικό ελάχιστο που απαιτείται για τη βλάστηση των χειμερινών δημητριακών. Ο προβλεπόμενος ψυχρός καιρός στο τέλος Νοεμβρίου θα οδηγήσει σε επιβράδυνση, και στα υψηλότερα χωράφια, όπου αναμένεται χιονόπτωση, σε παύση των βλαστικών διεργασιών στα χειμερινά δημητριακά. Ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης φθινοπωρινής ξηρασίας, ένα μεγάλο μέρος των φυτών βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης. Στο τέλος Νοεμβρίου, στα σιτάρια και τα κριθάρια θα παρατηρηθούν οι ακόλουθες φάσεις: βλάστηση, 1ο-2ο-3ο

φύλλο, και αρχή αγοράνισης μόνο σε ένα μικρό μέρος των φυτών σε μεμονωμένες τοποθεσίες της Πεδιάδας του Δούναβη (αγρομετεωρολογικός σταθμός Νοβάτσενε).

Οι αναμενόμενες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο θα αυξήσουν το επίπεδο των αποθεμάτων υγρασίας του εδάφους στο στρώμα των 50 cm. Οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στο τέλος της δεύτερης και στην αρχή της τρίτης δεκάδας του Νοεμβρίου, 30 – 40 l/m² (Ν. Σέλο - 82 l/m², Βιδίни - 76 l/m², Λομ - 51 l/m², Πλέβεν - 51 l/m², Σβίστοβ - 57 l/m², Σούμεν - 40 l/m², Σιλίστρα - 40 l/m², Δραγομάν - 67 l/m², Σαντάνски - 58 l/m²), βελτίωσαν τα αποθέματα υγρασίας του εδάφους και στα περισσότερα ορεινά πεδία ξεπεράστηκε το έλλειμμα υγρασίας στα χειμερινά δημητριακά.

Κατά την επόμενη περίοδο επίσης, η αυξημένη περιεκτικότητα σε υγρασία των ανώτερων στρωμάτων του εδάφους θα περιορίσει την εκτέλεση εποχιακής καλλιεργητικής επεξεργασίας του εδάφους. Θα υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες για φύτευση οπωροφόρων δέντρων στο τέλος Νοεμβρίου.

Πηγή: ΕΕΦΓΝ