

# Στα τέλη Φεβρουαρίου και στις αρχές Μαρτίου – μια περίοδος κατάλληλη για τη σπορά καρότων και κρεμμυδιών σε σειρές.

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 28.02.2023 Брой: 2/2023



Στις περισσότερες ημέρες της περιόδου από το τέλος Φεβρουαρίου και τις αρχές Μαρτίου, οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες θα συνεχίσουν να καθορίζονται από υψηλότερες από το κανονικό θερμοκρασίες, οι οποίες θα διατηρήσουν ενεργές τις βλαστικές διαδικασίες στα χειμερινά δημητριακά.

Στο σιτάρι και το κριθάρι, θα παρατηρηθούν τα στάδια ανάπτυξης του τρίτου φύλλου και της αποτόκισης. Στα πυρηνόκαρπα είδη, το κυρίαρχο στάδιο θα είναι ο μαζικός πρηξιμός των οφθαλμών.

Προς το τέλος της περιόδου, προβλέπεται πτώση των θερμοκρασιών και οι μέσες ημερήσιες τιμές τους θα είναι κοντά στο βιολογικό ελάχιστο που απαιτείται για τη βλάστηση στα χειμερινά δημητριακά.

Πιο ευνοϊκές συνθήκες για την επιπλέον λίπανση των φθινοπωρινών καλλιεργειών με αζωτούχα ορυκτά λιπάσματα, για την εκτέλεση εποχιακής καλλιεργητικής επεξεργασίας του εδάφους και κλάδευσης σε οπωρώνες και αμπελώνες θα προκύψουν στο τέλος του Φεβρουαρίου.

Οι προβλεπόμενες βροχοπτώσεις στο τέλος Φεβρουαρίου και τις αρχές Μαρτίου θα αναβάλουν τα ψεκασμούς φυτοπροστασίας στα πυρηνόκαρπα είδη κατά της συστροφής των φύλλων του ροδακινιού, του πρώιμου μωβ σήψης και της τρυπητής κηλίδας. Η περίοδος θα είναι κατάλληλη για φύτευση κρεμμυδιών σετ και σπορά σπανάκιου και καρότων.

Πηγή: ΕΜΥ