

Δυτικός πολωνικός σκαθάρι - *Agriotes ustulatus* Schall

Автор(и): Ρастителна защита
Дата: 05.04.2015 Брой: 4/2015



Ο δυτικός πολωνικός σκώρος βρίσκεται σε όλη τη χώρα. Προσβάλλει καλαμπόκι, ντομάτες, πατάτες, λάχανο και άλλα.

Το ενήλικο έντομο έχει ένα επιμήκη-οβάλ, ανοιχτό καφέ έως σκούρο καφέ σώμα με μήκος 8,5-12 mm. Έχει τριετή ανάπτυξη, η οποία συμβαίνει μέσα σε τέσσερα ημερολογιακά έτη.

Το πιο κοινό είδος σκώρου στις καλλιέργειες λαχανικών αναπτύσσει μια γενιά σε διάστημα 4-5 ετών και διαχειμάζει ως προνύμφες διαφόρων ηλικιών και ως ενήλικα έντομα στο έδαφος. Οι διαχειμασμένοι σκαθάριοι εγκαταλείπουν τους χώρους διαχείμασής τους στα τέλη Απριλίου και στις αρχές Μαΐου. Τρέφονται με μέρη λουλουδιών και φύλλα διαφόρων φυτικών ειδών για να φτάσουν σε σεξουαλική ωριμότητα, μετά την οποία ζευγαρώνουν και τα θηλυκά γεννούν τα αυγά

τους στο έδαφος γύρω από τα φυτά, μεμονωμένα ή σε ομάδες μέχρι 5-6 cm βάθος. Προτιμούν υγρά και πλούσια σε χούμο εδάφη. Τέτοια μέρη είναι συνήθως αγροί σε αγρανάπαυση, χωράφια με αλφάλφα, λιβάδια, ξέφωτα κ.λπ. Ένας σκαθάριος μπορεί να γεννήσει μέχρι 500-600 αυγά. Τα αυγά είναι πολύ ευαίσθητα σε υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή υγρασία. Το έμβρυο αναπτύσσεται αργά (20-30 ημέρες).