

Στο περιβόλι τον Ιούλιο

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.07.2023 Брой: 7/2023



Τον Ιούλιο, σε **μηλεώνες** όπου δεν έχει εμφανιστεί μόλυνση από κνίδιο, διακόπτεται ο ψεκασμός κατά της ασθένειας αυτής. Σε περίπτωση παρουσίας μόλυνσης σε φύλλα και καρπούς και με συχνές βροχοπτώσεις, συνεχίζεται ο κίνδυνος όψιμων μολύνσεων και αύξησης του βαθμού βλάβης των καρπών, γεγονός που στην περίπτωση αυτή καθιστά απαραίτητους τους εμβολιασμούς ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Για ποικιλίες μηλιάς που είναι ευαίσθητες στο ασπρίκι, συνεχίζεται επίσης ο ψεκασμός κατά της ασθένειας αυτής. Για τον ταυτόχρονο έλεγχο και των δύο ασθενειών, χρησιμοποιείται ένα από τα ακόλουθα μυκητοκτόνα: Bellis – 80 g/στρ, Sulgran – 750 g/στρ και Kumulus – 600–900 g/στρ κατά του ασπρίκι, και Chorus 50 WG – 0.03%, Difcor 250 EC – 15 ml/στρ, Koprations Duo – 300 g/στρ, Scab – 300 ml/στρ και Captan 80 WG – 150–180 g/στρ κατά του κνίδιου. Για τον ταυτόχρονο έλεγχο και των δύο ασθενειών, είναι κατάλληλα τα ακόλουθα: Flint Max 75

WG – 0.02%, Score 250 EC – 0.02%, Luna Experience – 20–75 ml/στρ, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/στρ, Revyona – 200 ml/στρ.

Για την πρόληψη της εμφάνισης ανθεκτικότητας του μύκητα που προκαλεί το κνίδιο (*Venturia inaequalis*), είναι προτιμότερο να εναλλάσσονται προϊόντα με διαφορετικό τρόπο δράσης στον παθογόνο ή να χρησιμοποιούνται μείγματα μυκητοκτόνων για τον έλεγχό του.

Ποικιλίες ανθεκτικές στο κνίδιο – Prima, COOP-10, Frolina, Liberty, Jonafree, Jonathan, Pioneer, McFree, Pilot, Topaz, Novamak, Sava, Rubinola, κ.λπ., ψεκάζονται μόνο κατά του ασπρίκι.

Για την **αχλαδιά**, πρέπει να συνεχιστεί ο ψεκασμός κατά του κνιδίου και των λευκών και καφέ κηλίδων των φύλλων. Για τον έλεγχο αυτών των ασθενειών, χρησιμοποιείται ένα από τα ακόλουθα μυκητοκτόνα: Difcor 250 EC – 15 ml/στρ, Luna Experience – 20–75 ml/στρ, Captan 80 WG – 150–180 g/στρ, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/στρ.

Για το **δαμάσκηνο** τον Ιούλιο, ο ψεκασμός κατευθύνεται κατά της καφέ σήψης και της σκουριάς. Κατά της καφέ σήψης, ο ψεκασμός πραγματοποιείται με ένα από τα ακόλουθα μυκητοκτόνα: Difcor 250 EC – 20 ml/στρ, Captan 80 WG – 150–180 g/στρ, Chorus 50 WG – 0.045%, Geoxe – 40–60 g/στρ. Κατά της σκουριάς, εγκρίνεται το Signum WG – 45 g/στρ, το οποίο είναι επίσης αποτελεσματικό κατά της καφέ σήψης.

Στις αρχές Ιουλίου, οι καρποί των πρώιμων ποικιλιών ροδάκινου αρχίζουν να ωριμάζουν και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν ψεκάζονται. Για τις **όψιμες ποικιλίες ροδάκινου**, συνεχίζεται ο έλεγχος του ασπρίκι, της κοιλότητας και της καφέ σήψης. Κατά του ασπρίκι, χρησιμοποιείται ένα από τα ακόλουθα μυκητοκτόνα: Score 250 EC – 0.02%, Luna Experience – 50 ml/στρ, Topaz 100 EC – 0.03%, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/στρ. Για τον έλεγχο της καφέ σήψης, ο ψεκασμός πραγματοποιείται με Delan 700 WDG – 0.05%, Chorus 50 WG – 0.045% ή Luna Experience – 63–75 ml/στρ.



Тон Ιούλιο, та βερίκοκα ωριμάζουν και δεν ψεκάζονται.

Για το **σμέουρο**, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν πραγματοποιείται κανένας ψεκασμός, με εξαίρεση τις **ποικιλίες που ξανακαρποφορούν** όπως το Lyulin. Για αυτές, απαιτούνται θεραπείες κατά της διδυμέλας και της άνθρακας. Χρησιμοποιείται ένα από τα ακόλουθα μυκητοκτόνα: Signum WG – 100 g/στρ και Funguran OH 50 WP – 0.15%. Με συχνές βροχοπτώσεις και υψηλή υγρασία αέρα, είναι επίσης απαραίτητος ψεκασμός κατά της γκρίζας σήψης. Χρησιμοποιείται το Switch 62.5 – 100 g/στρ.

Μετά τη συγκομιδή, τα φύλλα των **φυτειών φραουλιάς** θερίζονται, αφαιρούνται από τη φυτεία και καταστρέφονται με καύση ή θάβονται ώστε να αποσυντεθούν.