

Στα τέλη Αυγούστου – οι αгроμετεωρολογικές συνθήκες θα συνεχίσουν να καθορίζονται από ζεστό και ξηρό καιρό

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.08.2023 Брой: 8/2023



Τις περισσότερες ημέρες στο τέλος του Αυγούστου, οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες θα συνεχίσουν να καθορίζονται από ζεστό και ξηρό καιρό. Οι προβλεπόμενες μέγιστες θερμοκρασίες, που σε ορισμένες περιοχές φτάνουν και υπερβαίνουν τους 37°C, θα επιταχύνουν την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων ανάπτυξης των όψιμων καλλιεργειών ανοιξιάτικης σποράς.

Οι πρώιμοι υβριδισμοί καλαμποκιού έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξή τους και βρίσκονται σε πλήρη ωρίμανση. Στους μεσοόψιμους υβριδισμούς θα παρατηρηθεί κηρώδης ωρίμανση (Μπουζόβετς, Νικολάεβο, Καζανλάκι), ενώ στους όψιμους – γαλακτώδης ωρίμανση (αγρομετεωρολογικοί σταθμοί Ταργκοβίστε, Πλόβντιβ, Παζαρτζίκ).

Στον ηλίανθο, θα βρίσκεται σε εξέλιξη η ωρίμανση. Η συγκομιδή της καλλιέργειας πρέπει να πραγματοποιείται με περιεκτικότητα υγρασίας στους σπόρους περίπου 8% προκειμένου να διασφαλιστεί μακροχρόνια και ποιοτική αποθήκευση.

Στα αμπέλια των νότιων περιοχών θα παρατηρηθεί χρώμα ρώγας – αγρομετεωρολογικοί σταθμοί Σλίβεν, Λιουμπιμέτς, Χάσκοβο, Τσέρπαν, Πλόβντιβ. Σε αυτή τη φάση, μετά από βροχοπτώσεις, οι θεραπείες φυτοπροστασίας στοχεύουν στην προστασία των σταφυλιών από μόλυνση με γκρίζα σήψη.

Στο τέλος της περιόδου, θα σημειωθεί αλλαγή των αγρομετεωρολογικών συνθηκών από δυτικά προς ανατολικά – προβλέπονται χαμηλότερες θερμοκρασίες και τοπικές βροχοπτώσεις. Στις περιοχές όπου δεν θα πέσει βροχή, η έλλειψη υγρασίας του εδάφους θα εμποδίσει τις εργασίες πρωτογενούς και προσπορευτικής καλλιέργειας και τη σπορά του χειμερινού ελαιοκράμβη. Ο βαθμός πυροκινδυνότητας θα παραμείνει υψηλός εκεί.