

Στις αρχές Ιουνίου – με έναν ευνοϊκό συνδυασμό ζεστασιάς και υγρασίας, η βλάστηση των ανοιξιότικων καλλιεργειών θα προχωρήσει.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.06.2024 Брой: 6/2024



Κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, η ανάπτυξη των γεωργικών καλλιεργειών θα προχωρήσει με επιταχυνόμενο ρυθμό υπό πάνω από το κανονικό θερμικές συνθήκες και με πολύ καλές εφεδρείες υγρασίας του εδάφους - λόγω των σημαντικών βροχοπτώσεων του Μαΐου, οι οποίες ξεπέρασαν τους μηνιαίους κανόνες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση ορισμένες περιοχές στις ακραίες βορειοανατολικές και νοτιοδυτικές περιοχές.

Κατά την περίοδο, θα λάβει χώρα η πλήρωση των σπόρων στα χειμερινά σιτηρά στα υψίπεδα. Στις πεδινές περιοχές, το σιτάρι θα περάσει από τις ακόλουθες φάσεις: γαλακτώδης, μετάβαση σε κηρώδη, και κηρώδης ωρίμανση για τις καλλιέργειες στις νοτιοανατολικές περιοχές. Για το κριθάρι στις νότιες περιοχές, η κηρώδης ωρίμανση θα κυριαρχήσει.

Στις αρχές Ιουνίου, με έναν ευνοϊκό συνδυασμό θερμότητας και υγρασίας, η βλάστηση των ανοιξιότικων καλλιεργειών θα προχωρήσει. Θα παρατηρηθεί σχηματισμός φύλλων στον αραβόσιτο και τον ηλίανθο. Για τις καλλιέργειες ηλίανθου που σπάρθηκαν εντός της αγροτεχνικής περιόδου (Πλόβντιβ, Χάσκοβο, Λιούμπιμετς), θα λάβει χώρα σχηματισμός ταξιανθιών.

Οι αναμενόμενες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου θα διατηρήσουν κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών: περονόσπορος στις καλλιέργειες λαχανικών· όψιμη καστανή σήψη, ψώρα και ωίδιο στα οπωροφόρα δέντρα· περονόσπορος και ωίδιο στα αμπέλια, κάτι που απαιτεί έγκαιρη φυτοπροστασία μετά την παύση των βροχοπτώσεων.

Μια αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και κίνδυνος πτώσης των καλλιεργειών και ζημιάς στην όρθια συγκομιδή σιτηρών προβλέπονται για τις τελευταίες ημέρες της περιόδου.

Πηγή NIMH