

# Άμεσος έλεγχος ζιζανίων για υψηλές αποδόσεις ηλίανθου

Автор(и): ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ

Дата: 16.04.2025 Брой: 4/2025



Οι ζιζανιοκτόνοι της FMC Agro Βουλγαρίας – Express® 50 SG και Evorelle® Express® – παρέχουν επιλεκτική προστασία και καθαρά χωράφια στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης του ηλιοτρόπιου.

Οι ζιζανιοκτόνοι **Express® 50 SG** και **Evorelle® Express®** προορίζονται για τον επιλεκτικό έλεγχο ευρύφυλλων ζιζανίων σε **υβρίδια ηλιοτρόπιου ανεκτικά στο Express® και Evorelle® Express®**. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι ζιζανιοκτόνοι να **εφαρμόζονται μόνο σε ανεκτικά υβρίδια**, με τη λίστα να είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της FMC. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τους εκπροσώπους πωλήσεων της FMC.

Το Express® 50 SG και το Evorelle® Express® είναι οι μόνοι ζιζανιοκτόνοι που έχουν εγγραφεί για χρήση σε μεγάλο αριθμό υβριδίων ηλιοτρόπιο ανεκτών στο Express® 50 SG / Evorelle® Express®.

### **Express® 50 SG – αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα έναντι βασικών ευρύφυλλων ζιζανίων στον ηλιοτρόπιο**

Το Express® 50 SG είναι ένας συστημικός ζιζανιοκτόνος μετά τη βλάστησης που παρέχει αξιόπιστο έλεγχο των πιο διαδεδομένων και δύσκολα ελέγξιμων ευρύφυλλων ζιζανίων στον ηλιοτρόπιο, όπως **ο γαιδουράγκαθος, η περικοκλάδα, το αμάραντο, η στραμώνη, η ψάρα, η λευκή ψάρα** και άλλα. Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταματά μόνο λίγες ώρες μετά την εφαρμογή, και ο πλήρης ξηρασμός των ζιζανίων συμβαίνει εντός 15 έως 25 ημερών.

Για να εξασφαλιστεί η πλήρης αποτελεσματικότητα του προϊόντος, πρέπει να προστεθεί στο διάλυμα ψεκασμού ο βοηθητικός παράγοντας Trend® 90. Δεν συνιστάται η επεξεργασία φυτών υπό στρες.

### **Evorelle® Express® – μια νέα λύση για σοβαρές προκλήσεις**

Το Evorelle® Express® είναι ένας ζιζανιοκτόνος συνδυαστικής δράσης, προορισμένος για τον αποτελεσματικό έλεγχο ανθεκτικών ευρύφυλλων ζιζανίων στον ηλιοτρόπιο. Το Evorelle® Express® είναι ιδιαίτερα κατάλληλο υπό συνθήκες όπου υπάρχει εξάπλωση δύσκολα ελέγξιμων ζιζανίων, όπως **η κάνναβη του σκύλου, ο γαιδουράγκαθος, η στραμώνη, η ψάρα, το σόργο του Τζόνσον** και διάφορα **είδη λευκής ψάρας**. Το προϊόν διεισδύει γρήγορα στους ιστούς των ζιζανίων, μπλοκάροντας τις ενζυμικές διαδικασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη. Ορατά συμπτώματα εμφανίζονται εντός δέκα ημερών μετά την εφαρμογή, και ο ξηρασμός των ευαίσθητων ειδών συμβαίνει εντός 15–25 ημερών.

Ο έλεγχος των ζιζανίων δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον, αλλά η ανάπτυξη απαιτεί επίσης ισορροπημένη διατροφή. Τα φυλλόκορτα λιπάσματα και οι βιοδιεγέρτες της FMC – **Rhizomagic, Seamac™ OR, Nuvola™ AMIN** και **BO-LA™** – προμηθεύουν τα φυτά με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, αμινοξέα και βιοδραστικές ενώσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη, αυξάνουν την ανεκτικότητα και αντισταθμίζουν συνθήκες στρες. Μερικά από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των Rhizomagic, Seamac™ OR και Nuvola™ AMIN, περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Βουλγαρικής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (BFSA) για εγγεγραμμένα οργανικά και οργανο-ορυκτά λιπάσματα και είναι **κατάλληλα για χρήση στο πλαίσιο των οικοσχημάτων**.