

Στο οπωροφόρο κήπο τον Ιούλιο

Автор(и): проф.д-р Мария Боровинова, Институт по земеделие в Кюстендил

Дата: 21.07.2015 Брой: 7/2015



Για τα **αχλάδια**, πρέπει να συνεχιστεί το ψεκασμό κατά της τράχης. Μόνο δύο μυκητοκτόνα έχουν εγκριθεί για την καταπολέμηση αυτής της ασθένειας - Dithane M-45 – 0.3% και Luna Experience – 20-75 ml/deka, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα μυκητοκτόνα που αναφέρονται για την καταπολέμηση της τράχης της μηλιάς. Επίσης, πραγματοποιείται θεραπεία κατά των σκωλήκων των καρπών και κατά των ψυλλών του αχλαδιού, συγκεκριμένα κατά του κοινού φύλλου του αχλαδιού και του φύλλου του αχλαδιού. Για τον ταυτόχρονο έλεγχο αυτών των εντόμων, χρησιμοποιείται ένα από τα ακόλουθα εντομοκτόνα: Decis 2.5 EC – 0.03%, Decis 100EC – 12.5 ml/deka, Deca EC – 30-50 ml/deka, Karate Express WG – 60-80 g/deka, Vaztak New 10 EC – 0.02%, Sineis 480SC – 37.5 ml/deka, Sumi Alpha 5EC – 0.03%.

Ο ψεκασμός με μυκητοκτόνα για τις **κυδωνιές** είναι κατά της καφέ σήψης και των καφέ κηλίδων των φύλλων, για τις οποίες χρησιμοποιείται Horus 50WP – 0.03% ή Luna Experience – 20-75 ml/deka.

Για την καταπολέμηση των σκωλήκων των καρπών, ένα από τα εντομοκτόνα που αναφέρονται κατά της σκώρου προστίθεται στο διάλυμα του μυκητοκτόνου.

Τον Ιούλιο, συνεχίζεται η συγκομιδή των **γλυκών και ξινών κερασιών**, και δεν πραγματοποιείται ψεκασμός για αυτές τις δύο καλλιέργειες. Κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, πρέπει να μαζευτούν όλοι οι καρποί για να ελαχιστοποιηθεί η μόλυνση διαχείμασης από τη μύγα του κερασιού. Επιπλέον, όλοι οι καρποί που έχουν μολυνθεί με καφέ σήψη πρέπει να αφαιρεθούν και να απομακρυνθούν από το περιβάλλον.

Συνήθως τον Ιούλιο, σε νέα περιβόλια γλυκών και ξινών κερασιών που δεν καρποφορούν, όπου το πρόβλημα με το μαύρο ψείρα του κερασιού δεν επιλύθηκε τον Ιούνιο και η πυκνότητα της σφήκας του φύλλου του κερασιού είναι υψηλή, είναι απαραίτητο να γίνει ψεκασμός με ένα από τα εντομοκτόνα: Mospilan 20SG – 25g/deka, Karate Express WG – 40-60g/deka, Calypso 480SC – 0.02%.

Για τα δαμάσκηνα τον Ιούλιο, ο ψεκασμός με μυκητοκτόνα κατευθύνεται κατά της σκουριάς και της καφέ σήψης. Χρησιμοποιείται Hogus 50WG – 0.045%. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνεχίζονται οι θεραπείες κατά της σκώρου του δαμάσκηνου και του κοινού ασπίδιου του δαμάσκηνου. Κατά της σκώρου του δαμάσκηνου, χρησιμοποιείται ένα από τα ακόλουθα εντομοκτόνα: Vaztak New 100EC – 0.0125%, Decis 2.5EC – 0.05%, Dursban 4E – 0.15%, Coragen 20SC – 16-30 ml/deka, Sumi Alpha 5EC – 0.02%, Pirinex 48EC – 0.15%, Runner 240SC – 0.03%. Μεταξύ των αναγραφόμενων εντομοκτόνων, τα Vaztak New 100EC – 0.02%, Dursban 4E – 0.1% και Pirinex 48EC – 0.15% είναι επίσης αποτελεσματικά κατά του κοινού ασπίδιου του δαμάσκηνου, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση τους για ταυτόχρονο έλεγχο των εντόμων.

Στις αρχές Ιουλίου, αρχίζει η ωρίμανση των καρπών για τις πρώιμες ποικιλίες ροδάκινων, και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν πραγματοποιείται ψεκασμός για αυτές. Για τις όψιμες ποικιλίες, είναι απαραίτητος ο ψεκασμός κατά της καφέ σήψης, της ανατολικής σκώρου και του σκώρου του κλαδιού του ροδακίνου. Κατά της καφέ σήψης, μεταξύ των τριών εγκεκριμένων μυκητοκτόνων Delan 700 WDG – 0.05%, Horus 50WG – 0.045% και Luna Experience – 63-75 ml/deka, το Luna Experience είναι το πιο κατάλληλο καθώς έχει το συντομότερο διάστημα πριν από τη συγκομιδή. Κατά της ανατολικής σκώρου, χρησιμοποιείται ένα από τα ακόλουθα εντομοκτόνα: Avant 150EC – 33.3 ml/deka, Karate Express WG – 100-120 g/deka, Eforia 045 – 150 ml/deka, Nexide 015SC – 0.03%, Decis 2.5EC – 0.04%, Sumi Alpha 5EC – 0.02%, και κατά του σκώρου του κλαδιού του ροδακίνου, ένα από τα εντομοκτόνα: Karate Express WG – 100-120 g/deka, Sumi Alpha 5EC – 0.02%, Dursban 4E – 0.15%, Vaztak New 100EC – 0.015%.

Μετά τη συγκομιδή, τα φύλλα των **φυτειών φραουλών** κοπτίδια, αφαιρούνται από τη φυτεία και καταστρέφονται με καύση ή θάβονται για σήψη. Εάν η πυκνότητα του ακάρεου της φράουλας είναι υψηλή, γίνεται ψεκασμός για την πρόληψη ζημιάς στα νέα φύλλα. Δεν υπάρχει ακαριόκτονο για τον έλεγχο του ακάρεου της φράουλας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εγκεκριμένων προϊόντων προστασίας των φυτών. Σύμφωνα με την Αναπλ. Καθ. Έλενα Τσόλοβα, πολύ καλά

αποτελέσματα προκύπτουν από το Bi-58 – 0.1% - 0.15% ή το Nimazal TS σε συγκέντρωση 0.3-0.5%.

Οι θερμοκρασίες τον Ιούλιο είναι υψηλές, γεγονός που καθιστά απαραίτητο τον ψεκασμό νωρίς το πρωί ή το βράδυ όταν οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 25°C. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούνται προϊόντα με σύντομο διάστημα πριν από τη συγκομιδή, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε ορισμένες περιοχές, συνεχίζεται η συγκομιδή των όψιμων γλυκών και ξινών κερασιών, και για τα μήλα, τα δαμάσκηνα και τα ροδάκινα, αρχίζει η συγκομιδή των πρώιμων ποικιλιών.