

Κατάσταση των σοδειών σιταριού στην περιοχή Σάδοβο

Автор(и): доц. д-р Златина Ур, ИРГР, Садово; доц. д-р Евгений Димитров, ИРГР, Садово

Дата: 14.03.2026 Брой: 3/2026



Μέσα Μαρτίου στη Νότια Βουλγαρία, οι σποροκαλλιέργειες έχουν διαχειματίσει με επιτυχία και δεν έχουν παρατηρηθεί συνθήκες για ζημιές από παγετό ή τραυματισμούς από χαμηλές θερμοκρασίες. Μέχρι τη στιγμή αυτή (12.03.2026), η φυτοϋγειονομική κατάσταση των σοδειών σιταριού στην περιοχή Σάντοβο είναι καλή. Το σιτάρι βρίσκεται στο στάδιο του θάμνισμα, το οποίο προχωρά υπό φυσιολογικές συνθήκες και με επαρκή διαθεσιμότητα εδαφικής υγρασίας. Παρατηρούνται περιπτώσεις κιτρίνισματος σε κριθάρι λόγω έλλειψης θρεπτικών συστατικών.



Καταγράφεται κάποια επίπτωση ασθενειών και εντόμων. Με την αύξηση των μέσων ημερήσιων θερμοκρασιών, αναμένεται η εμφάνιση και εξάπλωση των ακόλουθων ασθενειών: Σηπτωρία (Septoria leaf blotch), αλευρώδης (powdery mildew) και καφετιά σκουρια (brown rust). Αυτοί οι παθογόνοι συναντώνται ετησίως στις σοδειές σιταριού του Σάντοβο και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς προκειμένου να επιτευχθούν βέλτιστες αποδόσεις.

Πραγματοποιείται επίσης παρακολούθηση για την εμφάνιση εντόμων πάνω από το οικονομικό κατώφλι. Για τους περισσότερους αγρότες, η ανοιξιάτικη λίπανση των καλλιεργειών έχει πραγματοποιηθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη.



Οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες αυτή τη στιγμή είναι σταθερές και υπάρχει προϋπόθεση για την ποιοτική εκτέλεση της προσπορευτικής καλλιέργειας στις εκτάσεις που προορίζονται για σπορά με πρώιμες ανοιξιάτικες καλλιέργειες (βίκος, μπιζέλια, ανοιξιάτικη κριθάρι). Τα εδάφη είναι καλά προμηθευμένα με υγρασία. Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν ύστεροι παγετοί στα τέλη Μαρτίου και αρχές Απριλίου, οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το σχηματισμό των συνιστωσών απόδοσης.