

"Αγροτεχνικές δραστηριότητες σε πολυετείς φυτείες τον Ιούνιο"

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 08.06.2026 Брой: 6/2026



Τον Ιούνιο, η ατμόσφαιρα στο Βόρειο Ημισφαίριο θα μεταβεί σταδιακά σε ένα τυπικό καλοκαιρινό καθεστώς. Η πολική δίνη είναι ήδη σημαντικά εξασθενημένη και ουσιαστικά διαλυμένη, πράγμα που σημαίνει ότι η επιρροή της στον καιρό της Ευρώπης θα είναι σημαντικά μικρότερη σε σύγκριση με τους ανοιξιάτικους μήνες. Για τη Βουλγαρία, αυτό σημαίνει κατά κύριο λόγο ζεστό και συχνά καυτό καιρό, αλλά με τις τυπικές για την εποχή απογευματινές καταιγίδες.

Ένας συνδυασμός θερμότερου αέρα από το νότο και ψυχρότερων ωκεάνιων κυματικών διαταραχών από τα βορειοδυτικά θα προκαλέσει περιόδους αστάθειας, καταιγίδες και σύντομα διαστήματα ψύξης, ειδικά στις δυτικές και ορεινές περιοχές της Βουλγαρίας.

Συνολικά, ο μήνας αναμένεται να είναι θερμότερος από το κλιματικό κανονικό, με μια αίσθηση πρώιμου καλοκαιριού από τις πρώτες κιόλας ημέρες, και προς το τέλος του μήνα, η χώρα μπορεί να βρεθεί υπό την επιρροή του πρώτου σοβαρού καύσωνα του έτους.

Οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν σταδιακά. Οι πρωινές τιμές θα κυμαίνονται μεταξύ 11 °C και 16 °C, και οι μέγιστες θα φτάσουν τους 25 °C – 30 °C. Στην Πεδιάδα του Δούναβη και στην Άνω Θρακική Πεδιάδα, δεν αποκλείονται οι πρώτοι πιο σημαντικοί καλοκαιρινοί καύσωνες με θερμοκρασίες γύρω στους 31 °C – 32 °C.

Γύρω στα μέσα της περιόδου, ένα ψυχρό ατμοσφαιρικό μέτωπο μπορεί να περάσει, φέρνοντας βραχύβιες αλλά έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Υπάρχει επίσης πιθανότητα χαλαζιού σε ορισμένα μέρη, τυπικό για την αρχή της καλοκαιρινής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης δεκαήμερης περιόδου, η ατμόσφαιρα θα παραμείνει δυναμική. Αναμένονται συχνές απογευματινές αναπτύξεις σωρειτομελανιών νεφών, ειδικά στη Δυτική και Κεντρική Βουλγαρία. Ο καιρός θα είναι τυπικός για τον Ιούνιο – ζεστά πρωινά, καυτά απογεύματα και τοπικές καταιγίδες στο τέλος της ημέρας. Οι βροχοπτώσεις δεν θα είναι εκτεταμένες, αλλά σε ορισμένα σημεία μπορεί να είναι σημαντικές σε ποσότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι μεταξύ 13 °C και 18 °C, και οι θερμοκρασίες της ημέρας – μεταξύ 27 °C και 33 °C. Σε ορισμένες περιοχές της Νότιας Βουλγαρίας, οι θερμοκρασίες μπορεί να πλησιάσουν τους 35 °C, ειδικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένης νότιας μεταφοράς. Κατά μήκος της ακτής της Μαύρης Θάλασσας, ο καιρός θα είναι πιο σταθερός, με περισσότερη ηλιοφάνεια και μικρότερο κίνδυνο βροχοπτώσεων.

Το τέλος του μήνα θα φέρει έναν πιο μόνιμο καλοκαιρινό χαρακτήρα στον καιρό. Ένα πιο σταθερό αντικυκλωνικό καθεστώς θα εγκατασταθεί πάνω από τη Νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια, το οποίο θα περιορίσει τις βροχοπτώσεις και θα αυξήσει τις θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πάνω από το κανονικό για την περίοδο. Τα ελάχιστα θα είναι μεταξύ 15 °C και 20 °C, και τα μέγιστα – μεταξύ 30 °C και 35 °C. Στις θερμότερες περιοχές της χώρας, δεν αποκλείονται τιμές έως 36 °C – 37 °C. Αυτή θα είναι πιθανότατα η περίοδος κατά την οποία θα βιώσουμε τον πρώτο πιο παρατεταμένο καλοκαιρινό καύσωνα της σεζόν.

Σε φυτώρια οπωροφόρων δέντρων

Τα σπορεία λιπαίνονται με 6-8 κιλά νιτρικής αμμωνίας ή την ίδια ποσότητα άλλου αζωτούχου λιπάσματος ανά δεκάριο και σκαλίζονται. Ποτίζετε εάν χρειάζεται.

Οι μητρικές φυτείες λιπαίνονται με 10-15 κιλά νιτρικής αμμωνίας ή την ίδια ποσότητα άλλου αζωτούχου λιπάσματος ανά δεκάριο και παράχωμα γίνεται. Εάν χρειαστεί, ποτίζονται πριν από το παράχωμα.

Στα φυτώρια, γίνεται αφαίρεση οφθαλμών για να διευκολυνθεί η φυσιολογική ανάπτυξη των εμβολιασμένων φυτών. Τα υποκείμενα και τα φυτώρια προετοιμάζονται για εμβολιασμό.

Σε οπωρώνες

Παρακολουθείτε ώστε οι δεσμοί να μην κόβουν τα κλαδιά των ψηλά εμβολιασμένων οπωροφόρων δέντρων και άγριων μορφών, χαλαρώνοντάς τους έγκαιρα εάν χρειαστεί. Οι ανταγωνιστικοί βλαστοί που φυτρώνουν από το υποκείμενο πρέπει να αφαιρούνται αμέσως.

Σε νεοφυτεμένα δέντρα γίνεται τακτικό σκάλισμα. Ποτίζετε εάν χρειάζεται. Μετά τη δεύτερη δεκαήμερη περίοδο, οι νεαρές φυτείες οπωροφόρων λιπαίνονται με 15-20 κιλά νιτρικής αμμωνίας ανά δεκάριο ή την ίδια ποσότητα άλλου αζωτούχου λιπάσματος, και εκτελείται ρηχή καλλιέργεια.

Κατά τον σχηματισμό παλμέτας, τα σκελετικά κλαδιά λυγίζονται προς τα κάτω όταν φτάσουν σε συνολικό μήκος 2 – 2.5 m για την πρώτη βαθμίδα, 1.5-2 m για τη δεύτερη και 1 m για την τρίτη. Για δέντρα ασθενούς ανάπτυξης, τοποθετούνται υπό γωνία 45-50°, και για δέντρα έντονης ανάπτυξης – υπό γωνία 45-45° ως προς την οριζόντια. Όταν μια βαθμίδα έχει σκελετικά κλαδιά διαφορετικού μήκους, λυγίζεται μόνο το ισχυρό, ενώ το αδύναμο αφήνεται να αναπτυχθεί και λυγίζεται επιπλέον αργότερα.

Η μηχανική αραίωση καρπών συνεχίζεται για τα ροδάκινα.

Σε εκτάσεις με εξασφαλισμένη άρδευση, πραγματοποιείται σπορά χλωρής λίπανσης.



κεράσια

Ξεκινά η μαζική συγκομιδή κερασιών και βύσσινων.

Σε φυτείες φράουλας

Φυτεύονται τα τελευταία σπορόφυτα φράουλας που φυλάσσονταν σε ψυγείο.

Η φροντίδα ζιζανίων συνεχίζεται για νεαρές και νεοφυτεμένες φυτείες. Ποτίζετε εάν χρειάζεται.

φράουλες

Η συγκομιδή συνεχίζεται. Μην μαζεύετε κατά τις ζεστές ώρες της ημέρας ή όταν υπάρχει δροσιά. Για νωπή κατανάλωση, μαζεύονται μαζί με τον κάλυκα του καρπού.

Σε θερμότερες τοποθεσίες, μετά τη συλλογή των τελευταίων καρπών, το άχυρο συλλέγεται αμέσως και απομακρύνεται. Οι φυτείες λιπαίνονται με 8-10 κιλά νιτρικής αμμωνίας ή την ίδια ποσότητα άλλου αζωτούχου λιπάσματος ανά δεκάριο, και πραγματοποιείται η πρώτη μετασυλλεκτική καλλιέργεια. Εάν είναι απαραίτητη η άρδευση, γίνεται πριν από τη λίπανση.

Σε φυτείες βατόμουρου

Πραγματοποιείται τακτική καλλιέργεια του εδάφους. Ποτίζετε εάν χρειάζεται, και σε καρποφόρες φυτείες, οι σειρές συνεχίζουν να καθαρίζονται από πολύ αδύναμους και υπερβολικούς βλαστούς. Η συμμάτινη υποστηρικτική δομή διατηρείται γερή.

βατόμουρα

Σε ορισμένες περιοχές, γύρω στα μέσα Ιουνίου, ξεκινά η συγκομιδή καρπών από πρώιμες ποικιλίες. Όταν αρχίζει η ωρίμανση, οι αποικίες μελισσών μεταφέρονται σε άλλες φυτείες, αλλά σε απόσταση όχι μικρότερη από 5 χλμ.

Σε φυτείες μαύρης σταφίδας

Το έδαφος στα σπορεία ριζοβολίας καλλιεργείται 2-3 φορές ανάλογα με την άρδευση, τις βροχοπτώσεις και την παρουσία ζιζανίων. Πραγματοποιούνται τακτικές καλλιέργειες τόσο σε νεαρές όσο και σε καρποφόρες φυτείες.

μαύρη σταφίδα

Γύρω στα μέσα του μήνα, η συγκομιδή καρπών ξεκινά σε ορισμένες θερμότερες τοποθεσίες.

Σε φυτείες με άλλες καλλιέργειες

Συνεχίζεται ο εμβολιασμός υποκειμένων λεμονιάς με αναπτυσσόμενο οφθαλμό.

Η φροντίδα για τη ριζοβολία μοσχευμάτων υπαίθρου ροδιάς, συκιάς και ιπποφαούς συνεχίζεται, με το φυτώριο να σκαλίζεται και να ποτίζεται τακτικά. Πραγματοποιούνται οι απαραίτητες επεμβάσεις ελέγχου ζιζανίων.

Προς το τέλος του μήνα, τα μη εμβολιασμένα υποκείμενα από πέρυσι εμβολιάζονται με αναπτυσσόμενο οφθαλμό χρησιμοποιώντας οφθαλμούς από λωτό.

Συνεχίζεται το δέσιμο των κληματίδων ακτινιδιάς σε πασσάλους στήριξης. Πραγματοποιείται λίπανση με το τελευταίο 1/3 της ετήσιας δόσης αζώτου που καθορίζεται για το ακτινίδιο. Οι πλευρικοί βλαστοί στο κύριο στέλεχος του ακτινιδίου καθαρίζονται για να τονωθεί η ανάπτυξή του και η συνολική διαμόρφωση. Διαμορφώνεται σε σχήμα T.

Σε αμπελώνες



Πραγματοποιείται καλλιέργεια του εδάφους όπου δεν έχει ήδη χλοοταπήσει, και εφαρμόζονται επεμβάσεις ελέγχου ζιζανίων. Σκοπός των καλλιεργειών είναι η καταστροφή των ζιζανίων και το σπάσιμο της κρούστας του εδάφους. Καλλιεργήστε ρηχά σε βάθος 8-10 εκ. Ο αριθμός των καλλιεργειών εξαρτάται από την προσβολή ζιζανίων και τις βροχοπτώσεις. Πραγματοποιούνται μηχανικά με καλλιεργητές και περιστροφικές σκαλιστικές μηχανές.

Κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας, δεν πρέπει να πραγματοποιούνται τέτοιες δραστηριότητες: καλλιέργεια εδάφους, άρδευση κ.λπ., που οδηγούν σε αύξηση της ατμοσφαιρικής υγρασίας και μείωση της θερμοκρασίας.

Για τον έλεγχο πολυετών ζιζανίων όπως το αγριάδα, ο περικοκλάδας και η βρώμη, χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα με δραστική ουσία glyphosate, όπως Gligol 36 SL ή Fast 36 SL, σε συγκέντρωση 500/1000 ml/δεκάριο.

Οι βλαστοί του αγριάδας ψεκάζονται όταν φτάσουν σε μήκος 20-30 εκ. Σταδιακά, μέσα σε 15-25 ημέρες, πεθαίνουν. Ο περικοκλάδας ψεκάζεται όταν οι βλαστοί φτάσουν σε μήκος 40-60 εκ. Μέσα σε 7-10 ημέρες, πεθαίνουν εντελώς. Ο αγρός περικοκλάδας ψεκάζεται κατά την περίοδο ανθοφορίας του.

Πραγματοποιούνται εργασίες πράσινου κλαδέματος σε νεαρούς αμπελώνες και σε καρποφόρους αμπελώνες.

Τσιμπήστε εκείνους τους βλαστούς στους οποίους δεν πραγματοποιήθηκε αυτή η πρακτική τον Μάιο. Στους υπόλοιπους, πραγματοποιείται δακτυλίωση, διατηρώντας μόνο την άκρη του βλαστού πάνω από τον δακτύλιο, η οποία πρέπει να εκπαιδευτεί και να δεθεί στο συρμάτινο στήριγμα. Πραγματοποιούνται επίσης μια δεύτερη αφαίρεση οφθαλμών των κορμών, πέρασμα και δέσιμο βλαστών στις φυτείες, χαμήλωμα για χαμηλή και μεσαία εκπαίδευση κορμού, και προσεκτική χαλάρωση των δεσμών σε πράσινα εμβολιασμένους βλαστούς.

Σε καρποφόρους αμπελώνες, πραγματοποιούνται πέρασμα και δέσιμο βλαστών στις φυτείες, και χαμήλωμα για χαμηλή και μεσαία εκπαίδευση κορμού.

Οι καρποφόρες κληματίδες δακτυλιώνονται. Η εργασία συνίσταται στην αφαίρεση ενός δακτυλίου φλοιού από τον καρποφόρο βλαστό, τον πράσινο βλαστό ή τον βραχίονα της κληματίδας, πλάτους 2-5 χιλ. Η δακτυλίωση εκτελείται με ένα ειδικό εργαλείο δακτυλίωσης. Πρέπει να τηρούνται αρκετές σημαντικές προϋποθέσεις: πρέπει να πραγματοποιείται 12-15 ημέρες μετά την ανθοφορία όταν οι ρόγες έχουν περίπου το μέγεθος ενός μπιζελιού· για κληματίδες κλαδεμένες σύμφωνα με το σύστημα εκπαίδευσης Guyot, δακτυλιώστε μετά την καμπύλη στο οριζόντιο τμήμα του καρποφόρου βλαστού. Για κληματίδες με εκπαίδευση κορμού, ο δακτύλιος πρέπει να γίνει στη βάση του καρποφόρου βλαστού. Οι ίδιες κληματίδες δακτυλιώνονται κάθε 3-4 χρόνια.

Οι τσαμπιές, τα τσαμπιά και οι ρόγες αραιώνονται.

Όταν το ποσοστό καρπόδεσης είναι πολύ υψηλό, αφαιρείται έως και το 40% του συνολικού αριθμού ρόγων. Αφαιρούνται κυρίως οι αγωνιμοποίητες, μικρές και παραμορφωμένες ρόγες. Αυτή η εργασία πραγματοποιείται κατά τις δροσερές ώρες της ημέρας, πολύ προσεκτικά, χωρίς υπερβολικό χειρισμό και χωρίς να τρίβεται το άνθος στις ρόγες των σταφυλιών.

Οι βλαστοί σε μητρικά τεμάχια δακτυλιώνονται και δένονται.

Στα σπορεία ριζοβολίας αμπέλου, χαλαρώνεται η κρούστα του εδάφους, καθαρίζονται οι δροσορίζες και λιπαίνονται οι κληματίδες.

Ο καθαρισμός των δροσοριζών πραγματοποιείται όταν εμφανίζονται οι πρώτοι έλικες στους βλαστούς. Οι ποσότητες κοπριάς και ανόργανων λιπασμάτων είναι συνήθως, αντίστοιχα: 1000-1500 κιλά κοπριάς, 3-4 κιλά νιτρικής αμμωνίας, 5-10 κιλά υπερφωσφορικού και 3-6 κιλά καλιούχου άλατος ή άλλης πηγής καλίου, ανά δεκάριο.