


Στο Φρουτοκήπο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο

Автор(и): проф.д-р Мария Боровинова, Институт по земеделіе в Кюстендил

Дата: 28.09.2015 *Брой:* 9/2015



Για τις **μηλιές** κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πραγματοποιείται ψεκασμός κατά της δεύτερης γενιάς του σκώρου και, εάν χρειάζεται, κατά των παθογόνων της τράχης και της σήψης των καρπών.

Για τον έλεγχο του σκώρου, ο κατάλογος των εγκεκριμένων εντομοκτόνων περιλαμβάνει: Afirm 095WG - 0.3%, Vaztak Nov 100EC – 0.0125%, Voliam Targo 063SC – 75 ml/daa, Decis 2.5EC – 0.03%, Dikline 2.5EC – 0.03%, Deca EC – 0.03%, Dursban 4E – 0.2%, Nexid 015CS – 0.03%, Sumi Alpha 5EC – 0.02%, Karate Zeon 5CS – 0.02%, Karate Express WG – 60-100 g/daa, Calypso 480SC – 0.02%, Coragen 20SC - 0.016% Reldan 40EC – 0.12%, Pirinex 48EC – 0.12%, Sineis 480SC – 20 – 37.5 ml/daa, Supersect Mega – 0.015%, Efcimetrin 10EC - 0.03%, Cyclone 10EC – 30 ml/daa, Cyperfor 100EC – 30 ml/daa, Sherpa 100EC – 0.03%. Σε περιβάλλια όπου έχει

ανιχνευτεί ζημιά από σκώρους φυλλορύκτες, θα πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί επεξεργασία. Τα εντομοκτόνα Dursban 4E – 0.2%, Sumi Alpha 5EC – 0.02%, Karate Express WG – 60-100 g/daa, Calypso 480SC – 0.02% και Sineis 480SC – 20 – 37.5 ml/daa μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ταυτόχρονο έλεγχο του σκώρου και των σκώρων φυλλορύκτων.

Το μυκητοκτόνο Luna Experience – 20–75 ml/daa θα πρέπει να προστεθεί στο διάλυμα του εντομοκτόνου για την προστασία των καρπών από τις όψιμες μολύνσεις των παθογόνων της τράχης και της σήψης των καρπών από μύκητες των γενών *Monilinia*, *Penicillium*, *Botrytis*, *Alternaria*, *Botryosphaeria*, κ.λπ. Οι ποικιλίες μηλιών των οποίων οι καρποί θα συγκομιστούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου πρέπει να ψεκάζονται με εντομοκτόνα που έχουν σύντομο διάστημα πριν από τη συγκομιδή.

Για τις όψιμες ποικιλίες αχλαδιών, ο έλεγχος κατά των σκώρων καρπών/σκώρου, του ανατολικού σκώρου καρπών και του σκώρου του αχλαδιού/ και των παθογόνων της σήψης των καρπών θα πρέπει να συνεχιστεί. Χρησιμοποιούνται τα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα που αναφέρονται για τις μηλιές.

Εάν επιτραπεί υψηλή πυκνότητα του κοινού φύλλου του αχλαδιού /4-6% βλαστοί με αποικίες/, οι φυτείες αχλαδιών ψεκάζονται με Decis 2.5 EC – 0.03%, Decis 100EC – 12.5 ml/daa, Deca EC – 30-50 ml/daa, Karate Express WG – 60-80 g/daa, Vaztak Nov 10 EC – 0.02%, Sineis 480SC – 37.5 ml/daa, Sumi Alpha 5EC – 0.03%.

Σε περιβόλια αχλαδιών όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί τακτικός έλεγχος των εντόμων, ο σκώρος των οφθαλμών του αχλαδιού συνήθως πολλαπλασιάζεται και η πυκνότητά του συχνά ξεπερνά το οικονομικό όριο βλαπτικότητας - 5-8 ανά δέντρο, γεγονός που καθιστά απαραίτητο τον ψεκασμό κατά των ενηλίκων πριν από την ωοτοκία με Dursban 4E – 0.15% ή Vaztak Nov 100EC – 0.0125%.

Οι καρποί των ποικιλιών **κυδωνιών** που καλλιεργούνται στη χώρα μας είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι στην όψιμη καφέ σήψη, τον γκρίζο μούχλασμα και τη μαλακή σήψη, τα οποία είναι ιδιαίτερα επιβλαβή κατά τη διάρκεια συχνών βροχοπτώσεων κατά την ωρίμανση των καρπών και αργότερα κατά την αποθήκευση. Αυτό καθιστά απαραίτητο τον ψεκασμό με Luna Experience – 20 – 75 ml/daa ή Topsin M 70WDG – 0.12%. Για την προστασία των καρπών από τη μόλυνση από τον σκώρο και τον ανατολικό σκώρο καρπών, ένα από τα εντομοκτόνα που αναφέρονται για τον έλεγχο του σκώρου προστίθεται στο διάλυμα του μυκητοκτόνου.