Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

Boxer Evo: καθαρή εκκίνηση για σιτηρά

syngenta, България

Ημερομηνία 21.09.2026 | **Τεύχος** 9/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Γλώσσα** EL
www.plant-protection.com/article/2470?lang=el



Boxer Evo είναι το νέο ζιζανιοκτόνο της Syngenta, που αναπτύχθηκε ως απάντηση σε μία από τις κύριες προκλήσεις στις καλλιέργειες σιτηρών: την προσβολή από ζιζάνια. Το προϊόν συνδυάζει δύο δραστικές ουσίες, το prosulfocarb και το diflufenican, με ισχυρή συνέργεια μεταξύ τους, που παρέχει αξιόπιστο και ευρέος φάσματος έλεγχο των ζιζανίων.

Εφαρμοζόμενο προ-φυτρώσεως ή πρώιμης μεταφυτρώσεως (φθινόπωρο), το Boxer Evo εξαλείφει τον ανταγωνισμό των ζιζανίων από την αρχή και δίνει στο σιτάρι, το κριθάρι, τη σίκαλη και το triticale μια καθαρή εκκίνηση και καλές συνθήκες για ανάπτυξη.

Βασικά πλεονεκτήματα:

Υψηλή αποτελεσματικότητα πρώιμου ελέγχου ευρέος φάσματος αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων

Εξαιρετικός έλεγχος δύσκολων αγρωστωδών ζιζανίων: ήρα, αγριοβρώμη, βρώμη, αγριοσίκαλη, ετήσια πόα (προ- και μεταφυτρώσεως)

Αξιόπιστη αποτελεσματικότητα κατά πλατύφυλλων ζιζανίων: βερόνικα, αγριοπανσές, κολλητσίδα, χαμομήλι, κενταύρια και άλλα

Δύο διαφορετικοί τρόποι δράσης για υψηλότερη αποτελεσματικότητα και βιώσιμο έλεγχο

Εξαιρετικός συνεργάτης για τη διαχείριση ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων των δύσκολων πληθυσμών

Το Boxer Evo είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούν να χτίσουν οι καλλιεργητές.

Τρόπος δράσης

Το Boxer Evo συνδυάζει δύο δραστικές ουσίες με δύο διαφορετικούς τρόπους δράσης:

Prosulfocarb αναστέλλει την κυτταρική διαίρεση και την εμφάνιση και ανάπτυξη των ζιζανίων. Απορροφάται κυρίως από το ριζικό σύστημα των φυτών, με την κύρια δράση να λαμβάνει χώρα κατά την πρόσληψη μέσω του υποκοτυλίου. Προσλαμβάνεται από το έδαφος μέσω των ριζών.

Diflufenican διαταράσσει τη σύνθεση καροτενοειδών, προκαλώντας την αποδόμηση της χλωροφύλλης.

Ο συνδυασμός δύο διαφορετικών τρόπων δράσης παρέχει υψηλότερη αποτελεσματικότητα και είναι κλειδί για τη βιώσιμη διαχείριση ανθεκτικότητας.

Ολοκληρωμένη τεχνολογία για τη διαχείριση ανθεκτικών μορφών ήρας

ISSN 2815-522X

Έλεγχος σε δύο βασικές στιγμές της ανάπτυξης των καλλιεργειών σιτηρών:

Φθινόπωρο, Boxer Evo: 300 ml/ha, προ-φυτρώσεως ή μεταφυτρώσεως (1ο-2ο φύλλο)

Άνοιξη, Ανοχα: 160-180 ml/ha

Πλεονεκτήματα της φθινοπωρινής εφαρμογής: εξάλειψη των βλαστάνοντων και αναδυόμενων ζιζανίων το φθινόπωρο, μείωση της τράπεζας σπόρων ζιζανίων στο έδαφος, δημιουργία συνθηκών για καθαρή εκκίνηση και καλή ανάπτυξη των καλλιεργούμενων φυτών.

Πλεονεκτήματα της ανοιξιάτικης εφαρμογής: εξάλειψη του ανταγωνισμού από αναδυόμενα ζιζάνια, μείωση της αρνητικής επίδρασης του ανταγωνισμού, διατήρηση του δυναμικού απόδοσης ανά μονάδα επιφάνειας.

Δύο διαφορετικοί τρόποι δράσης σε δύο βασικές στιγμές σημαίνουν υψηλότερη αποτελεσματικότητα και μειωμένη πυκνότητα προσβολής από ζιζάνια.

Εγγεγραμμένο για: Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Triticale

Χρόνος εφαρμογής σύμφωνα με το BBCH

Εδαφική ή πρώιμη βλαστική εφαρμογή στο BBCH 00-09 (προ-φυτρώσεως) ή BBCH 10-13 (1ο-2ο φύλλο), δόση 300 ml/ha.

Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε δοκιμαστικά χωράφια της Syngenta Bulgaria

Αποτελέσματα από εδαφική και πρώιμη βλαστική εφαρμογή την περίοδο 2024-2025 στη Νότια Κεντρική Βουλγαρία (χωριό Otets Kirilovo) και τη Βορειοανατολική Βουλγαρία (πόλη Poprovo), με σαφώς εκφρασμένη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με τον μάρτυρα.

Συστάσεις εφαρμογής

Εδαφική ή πρώιμη βλαστική (1ο-2ο φύλλο)

Δόση εφαρμογής: **300 ml/ha**

Όγκος νερού: **16-30 l/ha**

Δείτε περισσότερα για το **Boxer Evo** από τη Syngenta!