Растителна защита

електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

Τον Οκτώβριο: Ποιες θα είναι οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες και πότε είναι οι βέλτιστες ημερομηνίες σποράς

Растителна Защита

Ημερομηνία 09.10.2026 | **Τεύχος** 10/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Γλώσσα** EL
www.plant-protection.com/article/2478?lang=el



Κατά τις πρώτες δέκα ημέρες του Οκτωβρίου, οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες θα καθοριστούν από άστατο καιρό και μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες γύρω και κάτω από τις κλιματικές νόρμες. Ο προβλεπόμενος δροσερός και υγρός καιρός τις περισσότερες ημέρες της περιόδου θα αποτελέσει προϋπόθεση για την ανάπτυξη παθογόνων - όψιμη καστανή σήψη στους καρπούς φθινοπωρινών ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων (Monilia fructigena), τεφρά σήψη (Botrytis cinerea) στον ασυγκόμιστο τρύγο. Αναμένονται μαζικοί παγετοί στο τέλος της δεκαημέρου, γεγονός που απαιτεί έγκαιρη συγκομιδή των λαχανικών που υπόκεινται σε παγετό.



Όψιμη καστανή σήψη στους καρπούς φθινοπωρινών ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων (Monilia fructigena)

Κατά τις πρώτες δέκα ημέρες του Οκτωβρίου, προβλέπονται βροχοπτώσεις, βελτίωση της κατάστασης των ανώτερων στρωμάτων του εδάφους και των συνθηκών για την εκτέλεση εποχιακής κατεργασίας του εδάφους. Η ξηρασία στο τέλος του καλοκαιριού εμπόδισε την εκτέλεση της προ-σποράς κατεργασίας των εκτάσεων που προορίζονται για σπορά με χειμερινές

καλλιέργειες. Για τον λόγο αυτό, οι αγροτεχνικές προθεσμίες του Σεπτεμβρίου για τη σπορά χειμερινής ελαιοκράμβης έχουν χαθεί.



Ο Οκτώβριος είναι η βέλτιστη εποχή για τη σπορά χειμερινών σιτηρών. Κατά τις πρώτες δέκα ημέρες είναι η αγροτεχνική προθεσμία για τη σπορά σιταριού στη Βόρεια Βουλγαρία, από 15 έως 25 Οκτωβρίου - στη Νότια Βουλγαρία, και στο τέλος του μήνα – στις περιοχές κατά μήκος της ακτής της Μαύρης Θάλασσας.

Οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες την περίοδο 9-16 Οκτωβρίου θα είναι δυναμικές. Στην αρχή αυτής της επταήμερης περιόδου, οι προβλεπόμενες μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες θα είναι πάνω από το κανονικό, και κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης θα είναι εντός των κλιματικών νορμών. Στην αρχή της περιόδου, προβλέπονται τοπικές και ελαφρές βροχοπτώσεις στη Δυτική Βουλγαρία, και προς τα μέσα επίσης στις πεδινές περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Βουλγαρίας. Σε ορισμένα σημεία οι ποσότητες θα είναι σημαντικές, γεγονός που θα βελτιώσει την ύγρανση των ανώτερων στρωμάτων του εδάφους. Δεν αναμένονται συνθήκες για τον σχηματισμό παγετών.

Με εξαίρεση ορισμένες περιοχές στη Δυτική Βουλγαρία, κατά το πρώτο μισό της προβλεπόμενης περιόδου, οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες θα είναι κατάλληλες για την τελική συγκομιδή των αμπελώνων και των οπωρώνων, τον καθαρισμό των εκτάσεων από καλλιέργειες γραμμής και όψιμα λαχανικά, καθώς και για τη συλλογή ζωοτροφών και ζαχαρότευτλων, που βρίσκονται στη φάση της τεχνολογικής ωρίμανσης. Οι συνθήκες θα είναι κατάλληλες για την εκτέλεση αγροτεχνικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη σπορά χειμερινών σιτηρών. Σε περίπτωση μεγάλης προσβολής από ζιζάνια των εκτάσεων, συνιστάται η διενέργεια φθινοπωρινής εφαρμογής ζιζανιοκτόνων.



Μέχρι τα μέσα της περιόδου, οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν την εφαρμογή ορυκτών και οργανικών λιπασμάτων, καθώς και την προ-χειμερινή φύτευση κρεμμυδιών για φρέσκα, χειμερινού σκόρδου, μαρουλιού και σπανακιού.

Οι βροχές που αναμένονται κατά το δεύτερο μισό της προβλεπόμενης περιόδου θα περιορίσουν σημαντικά τις δυνατότητες εκτέλεσης γεωργικών δραστηριοτήτων.

Κατά τη δεύτερη και τρίτη δεκαήμερο, οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες θα καθοριστούν από θερμοκρασίες κοντά στις συνήθεις. Οι αναμενόμενες βροχοπτώσεις κατά το πρώτο μισό της δεύτερης δεκαημέρου, στην αρχή της τρίτης και στο τέλος του μήνα, θα βελτιώσουν τα αποθέματα εδαφικής υγρασίας στο στρώμα των 50 cm και τις συνθήκες για την πορεία των αρχικών φάσεων της βλάστησης των σπαρμένων χειμερινών καλλιεργειών. Στο τέλος του Οκτωβρίου, στο σιτάρι και το κριθάρι, ανάλογα με τις ημερομηνίες σποράς, θα παρατηρηθούν οι φάσεις της εκβλάστησης και του σχηματισμού 1-2-3 φύλλων.



Τον Οκτώβριο, οι φθινοπωρινές καλλιέργειες δέχονται επίθεση από παράσιτα. Στα χειμερινά σιτηρά, πρέπει να παρακολουθείται η παρουσία του κοινού αρου-

ISSN 2815-522X

раίου, του σιταρόψειρου και των μυγών του σιταριού. Όταν ο αριθμός των παρασίτων υπερβαίνει το οικονομικό όριο ζημιάς (ΟΟΖ), απαιτείται έγκαιρη επέμβαση. Για τον κοινό αρουραίο, το ΟΟΖ είναι 2 ενεργές αποικίες ανά στρέμμα, για το σιταρόψειρο - 3 προνύμφες/m².