

Στο αμπέλι και το περιβόλι τον Απρίλιο

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.04.2016 Брой: 4/2016



Αμπελώνες

Οι μετεωρολογικές συνθήκες κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου είναι συνήθως πολύ ευνοϊκές για την εμφάνιση ασθενειών του αμπελιού. Οι περίοδοι πριν και κατά τη διάρκεια της άνθησης είναι οι πιο κρίσιμες για μόλυνση από κακή τάφρο και οίδιο και για προσβολή από ακάρεα και σκώρους.

Κύριες εχθροί για την περίοδο

Οίδιο (ασπρίλα)

Κακή τάφρο του αμπελιού

Κίτρινο ακάρεο του αμπελιού

Εριοφυΐδια ακάρεα

Ευρωπαϊκός σκώρος του αμπελιού

Κοκκοειδής του αμπελιού

Οπωροφόρα

Κατά το μήνα, σχηματίζονται ενεργά και αυξάνονται σε μέγεθος οι καρποί των οπωροφόρων ειδών. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συχνές βροχοπτώσεις καθιστούν απαραίτητη την εντατική φυτοπροστασία για προστασία από ασθένειες. Απαιτούνται τακτικοί ελέγχοι και επιθεωρήσεις για παρακολούθηση της εμφάνισης και εξέλιξης ασθενειών και εχθρών. Στα μηλοειδή, ο έλεγχος κατευθύνεται κατά των κυρίων ασθενειών και εχθρών – τσουκνίδα, ασπρίλα, πυρκαγιά, αφίδες, φυλλοφάγες κάμπιες, καρποφάγες σκώρες κ.λπ. Στα πυρηνόκαρπα, δίνεται προσοχή σε επιθέσεις από μούχλωμα άνθους (πρώιμη καφέ σήψη), τρύπα σφαίρας, ασπρίλα, λευκή σκουριά, Γνωμόνια, καρποφάγες σκώρες, αφίδες κ.λπ. Η δυναμική και η πυκνότητα πληθυσμού των καρποφάγων σκώρων προσδιορίζονται με την τοποθέτηση φερομονικών παγίδων στους καρπούς, καθώς και κίτρινων κολλητικών πλακών τύπου "Rebell" για τον καθορισμό της έναρξης πτήσης της μύγας του κερασιού.

Κύριες εχθροί για την περίοδο

Τσουκνίδα της μηλιάς

Ασπρίλα της μηλιάς

Κοκκοειδής San José

Φθινοπωρινός ιστιοκλώστης

Στη μηλιά, οι θεραπείες κατά των οικονομικά σημαντικότερων ασθενειών – τσουκνίδας και ασπρίλας – μπορεί να πραγματοποιηθούν σε συνδυασμό.

Τα καταχωρημένα μυκητοκτόνα για έλεγχο παρατίθενται στο Μητρώο Εγκεκριμένων Προϊόντων Φυτοπροστασίας /2016, που δημοσιεύεται από το περιοδικό "Φυτοπροστασία".