

Η Syngenta παρουσίασε το νέο υβρίδιο θερμοκηπιακού αγγουριού Tribuno F1 στο Πετριχ

Автор(и): syngenta, България
Дата: 17.05.2016 Брой: 5/2016



Για ένα ακόμη συνεχόμενο έτος, η Syngenta διοργάνωσε ημέρα ανοιχτών θυρών για παραγωγούς θερμοκηπιακού αγγουριού με μακριά καρπούς. Φέτος, η συνάντηση διοργανώθηκε με την ευγενική βοήθεια της εταιρείας "V and VGD Greenhouses Petrich" Ltd., ιδιοκτήτριας του μεγαλύτερου θερμοκηπιακού συγκροτήματος στην περιοχή.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση δύο νέων προϊόντων στο πορτφόλιο της Syngenta, συγκεκριμένα του νέου υβριδίου θερμοκηπιακού αγγουριού Tribuno και του πιο πρόσφατου φυτοπροστατευτικού ευρέος φάσματος για αγγούρια - Cidely Top.



Στη συνάντηση συμμετείχαν μερικοί από τους κύριους παραγωγούς της περιοχής, οι οποίοι είδαν προσωπικά και πειστήκαν για το υψηλό δυναμικό παραγωγικότητας του υβριδίου, το οποίο πλέον δεν αποτελεί μυστικό για κανέναν. Το Tribuno συνδυάζει καλή ανθεκτικότητα σε ασθένειες, ευελιξία όσον αφορά την περίοδο μεταφύτευσης και υψηλό δυναμικό απόδοσης. Η πλαστικότητα του Tribuno του επιτρέπει να καλλιεργείται εξίσου καλά την άνοιξη και το καλοκαίρι σε γυάλινα και πολυαιθυλενικά θερμοκήπια. Διακριτικό χαρακτηριστικό του υβριδίου είναι η ισορροπημένη βλαστική-γενετική ανάπτυξη. Το φυτό έχει μεσαίου μεγέθους φύλλα και είναι ανεκτικό στην έκτρωση των ανθών κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης. Οι καρποί του Tribuno πληρούν ακριβώς τις απαιτήσεις της βουλγαρικής αγοράς. Είναι σκούρο πράσινοι, γυαλιστεροί και ελαφρώς ραβδωτοί. Το μήκος τους είναι περίπου 30-34 cm και δεν σχηματίζουν λαιμό. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του υβριδίου είναι η γρήγορη μετάβαση της καρποφορίας από τον κεντρικό βλαστό σε πλευρικούς κλάδους και η υψηλή τελική απόδοση τόσο σε άνοιξη όσο και σε καλοκαιρινή μεταφύτευση.

Στη φυτοπροστασία, η έμφαση δόθηκε στο πιο πρόσφατο φυτοπροστατευτικό της Syngenta για καλλιέργειες κολοκυνθοειδών. Αυτό είναι προς το παρόν το μόνο φυτοπροστατευτικό ευρέος φάσματος στη Βουλγαρία που ελέγχει 5 σημαντικές ασθένειες στα αγγούρια. Το Cidely Top έχει εξαιρετική δράση έναντι της **αιθαλής** *Podosphaera xanthii*, *Erysiphe cichoracearum*, της **alternaria** *Alternaria cucumerina*, της **μαύρης σήψης του βλαστού** *Didymella bryoniae*, της **ψύρας** *Cladosporium cucumerinum*, της **ανθράκωσης στα κολοκυνθοειδή** *Colletotrichum lagenarium*.



Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του Cidely Top είναι η δράση του μέσω της αέριας φάσης, η οποία είναι καθοριστική στον αγώνα κατά της αιθαλής, ειδικά σε καλλιέργειες με εξαιρετικά ανεπτυγμένη βλαστική μάζα. Σε τέτοιες καλλιέργειες, η διείσδυση των φυτοπροστατευτικών στο εσωτερικό των φυτών είναι δύσκολη, αλλά αυτό δεν ισχύει για το Cidely Top, καθώς μέσω της αέριας φάσης του το φυτοπροστατευτικό καταφέρνει να διεισδύσει βαθιά. Το Cidely Top είναι ένα καινοτόμο προϊόν διαμορφωμένο με βάση δύο ενεργές ουσίες με διαφορετικούς τρόπους δράσης - αυτό αυξάνει την επιθετικότητα του φυτοπροστατευτικού έναντι των παθογόνων. Οι δύο ενεργές ουσίες ανήκουν σε διαφορετικές χημικές ομάδες, γεγονός που με τη σειρά του εμποδίζει την ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Το Cidely Top είναι ενεργό έναντι όλων των στελεχών της αιθαλής, ακόμη και αυτών που είναι ανθεκτικά στα τριαζόλια. Το Cidely Top συνιστάται για χρήση κατά την πρώτη εμφάνιση συμπτωμάτων ασθένειας. Οι συστάσεις είναι για δύο εφαρμογές σε διαστήματα 10 ημερών. Η δοσολογία εφαρμογής του Cidely Top είναι 100 ml/στρέμμα και το διάστημα ασφαλείας πριν από τη συγκομιδή είναι 3 ημέρες.