

Ποιος προκαλεί τον πρόωρο πέσιμο των δαμάσκηνων;

Автор(и): Ραστίτελνα ζαχίτα
Дата: 06.02.2017 Брой: 2/2017



Οι δαμάσκηνοι ανθίζουν άφθονα, αλλά από το Μάιο μέχρι τη συγκομιδή υπάρχουν περίοδοι πρόωρης πτώσης του καρποφορικού και των καρπών, γεγονός που μειώνει σημαντικά τις αποδόσεις. Εάν είναι γνωστές οι αιτίες αυτού, ορισμένες από αυτές θα μπορούσαν να αποτραπούν.

- Το νέο καρποφορικό πέφτει σύντομα μετά την άνθηση. Αιτία – έλλειψη σπόρου λόγω ακατάλληλης γονιμοποίησης ή εκφυλισμού των ωοθηκών.
- Οι νέοι καρποί πέφτουν (Ιουνιακή πτώση) – από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου έως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Αιτία – ανεπαρκής συσσώρευση αφομοιωτών στα φυτά κατά το προηγούμενο έτος και έλλειψη νερού.
- Οι καρποί πέφτουν μαζί με τους μίσχους τους, έχουν δύο τρύπες και μια μυρωδιά κοριού. Η πτώση ξεκινάει το Μάιο και τελειώνει στις αρχές Ιουνίου. Αιτία – μαύρη πριονίτσα του δαμάσκηνου και κίτρινη πριονίτσα του δαμάσκηνου.

- Οι καρποι πέφτουν κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και τις αρχές Ιουλίου. Στον σπόρο των καρπών που έχουν πέσει υπάρχει μια ασπριδερή προνύμφη με καφέ κεφάλι, χωρίς πόδια και με σώμα λεπτό και στα δύο άκρα. Αιτία – εντομοι σποροφάγοι του γένους *Eurytoma*.
- Προσυγκομιδιακή πτώση καρπών. Αιτία – διαταραγμένη ισορροπία μεταξύ αυξινών και αιθυλενίου.