

"Μανά πατάτας"

Автор(и): Растителна защита
Дата: 13.02.2017 Брой: 2/2017



Ο παθογόνος παράγοντας της νόσου της παρθένιας στις ντομάτες (ο **μύκητας *Phytophthora infestans***) προσβάλλει όλα τα υπέργεια μέρη των φυτών ντομάτας. Επομένως, θα πρέπει να ελέγχονται τα θερμοκήπια για την εμφάνιση συμπτωμάτων της νόσου. Οι πρώτες κηλίδες πρέπει να αναζητούνται στην περιφέρεια των χαμηλότερων φύλλων. Παρατηρούνται ακανόνιστες έως στρογγυλές κηλίδες εμποτισμένες με νερό, οι οποίες αργότερα γίνονται καφέ. Υπό υψηλή υγρασία, ένας δακτύλιος ασπριδεράς μούχλας που σχηματίζει σπόρια εμφανίζεται στην κάτω πλευρά των κηλίδων.

Στρατηγική Καταπολέμησης

Οι εγκαταστάσεις καλλιέργειας πρέπει να αερίζονται τακτικά. Θα πρέπει να αποφεύγεται η βρέχυνση των φυτών και η παραμονή σταγόνων νερού πάνω τους. Σε θερμαινόμενα θερμοκήπια, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αύξηση της θερμοκρασίας.

Прин από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της νόσου, πρέπει να πραγματοποιούνται προληπτικές επεμβάσεις.

Εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

acrobat r - 0.25% (250 g/στρέμμα), acrobat plus wg - 200 g/στρέμμα, valbon - 180-200 g/στρέμμα, verita wg - 0.15%, vincer wg - 200 g/στρέμμα, equation pro - 0.04% (40 g/στρέμμα), carial star - 60 ml/ στρέμμα, consento sc - 200 ml/στρέμμα, corset 60 wg - 20-30 g/στρέμμα, corset m df - 0.25%, quadris 25 sc - 0.075%, cupertin m - 400 g/στρέμμα, lieto - 40-45 g/στρέμμα, mancozeb 80 wp - 0.25%, manfil 75 wg - 210 g/στρέμμα, χλωριούχο χαλκό 50 wp - 0.25 %, melody compact 49 wg - 185 g/στρέμμα, pencozeb 80 wp - 200 g/στρέμμα, pencozeb 75 wg - 210 g/στρέμμα, pergado copper 27 wg - 500 g/στρέμμα, polyram df - 0.2%, proxanil - 250 ml/στρέμμα, revus 250 sc - 0.05% (50 g/στρέμμα), ridomil gold mc 68 wg - 0.25%, ridomil gold r wg - 500 g/στρέμμα, sankozeб 80 wp - 200 g/στρέμμα, sinstar - 70-80 ml/στρέμμα, fortuna globe - 200 g/στρέμμα, funguran oh 50 wp - 0.15 %, champion wp/macc 50 wp/champ wp - 0.15%, captan 80 WG - 150-190 g/στρέμμα.