

'Θρίπες σε ντομάτες και αγγούρια'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 20.02.2017 Брой: 2/2017



Στα προσβεβλημένα φυτικά όργανα (φύλλα, μίσχους, άνθη και καρποί) σχηματίζονται μικροσκοπικές λευκωπές κηλίδες με σκούρες κουκκίδες, που αποτελούν τις κενώσεις του εντόμου. Σε υψηλότερη πυκνότητα πληθυσμού, οι κηλίδες συγχωνεύονται. Στα θερμοκήπια επιβλαβείς είναι:

Θρίπας του καπνού *Thrips tabac* – απαντάται κυρίως στο φύλλωμα, προσβάλλοντας λιγότερο συχνά τα άνθη. Ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξή του είναι οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία αέρα.

Δυτικός (Καλιфорνέζικος) θρίπας των ανθέων *Franklinella occidentalis* – έχει διαπιστωθεί ότι στα αγγούρια το έντομο προτιμά τα άνθη. Τα γενετικά όργανα των φυτών (μπούμπουρες και ωάρια), που προσβάλλονται στα πρώιμα στάδια ανάπτυξής τους, ξεραίνονται και πέφτουν.

Θρίψας των θερμοκηπίων *Heliothrips haemorrhoidalis* – οι προνύμφες και οι ενήλικες ρουφούν χυμό από τα φύλλα των φυτών. Η χαμηλή σχετική υγρασία αέρα επηρεάζει δυσμενώς τη ζωτική δραστηριότητα του πληθυσμού.

Στρατηγική αντιμετώπισης του εντόμου: Εκτός από την τακτική επιθεώρηση των φυτών για τον προσδιορισμό της παρουσίας και της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων, θα πρέπει να τοποθετούνται μπλε κολλητές παγίδες.

Εγκεκριμένα προϊόντα φυτοπροστασίας:

- κατά των θρίψα: DEKA EC / DESHA EC / DENA EC - 30 ml/ha, KARATE EXPRESS WG / NINJA / FORZA - 42-80 g/ha, METEOR - 60-70 ml/100 l νερού και NATURALIS - 75-100 ml/ha.
- κατά του Καλιφορνέζικου θρίψα: FURY 10 EC - 0.015%

Για ντομάτες:

- κατά των θρίψα: DICARZOL 10 SP - 556 g/ha.
- κατά του Καλιφορνέζικου θρίψα: SYNEIS 480 SC - 10-37.5 ml/ha.

Για αγγούρια:

- κατά του θρίψα του καπνού: LANAT 25 WP - 80-100 g/ha.
- κατά του Καλιφορνέζικου θρίψα: SYNEIS 480 SC - 10-25 ml/ha.