

Αγρομετεωρολογική πρόγνωση για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.03.2017 Брой: 3/2017



Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες θα χαρακτηρίζονται από αυξημένη δυναμική. Μετά τη βραχυπρόθεσμη πτώση των θερμοκρασιών στις αρχές του μήνα, αναμένεται σημαντική βελτίωση των θερμικών συνθηκών κατά την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Οι προβλεπόμενες υπεράνω του κανονικού θερμοκρασίες, με μέγιστες τιμές έως και 20°C, θα οδηγήσουν σε ενεργοποίηση της βλάστησης των φθινοπωρινών σποράς και των πρώιμων καρποφόρων σε ανθοφορία στις αγροτικές περιοχές της χώρας.

Οι υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες στο τέλος του Φεβρουαρίου, που σε ορισμένα σημεία έφτασαν τους 21-23°C (Βιδίν, Βράτσα, Λόβετς, Βελίκο Τάρνοβο, Παζαρτζίκ), έχουν επαναφέρει τις βλαστικές διαδικασίες στο σιτάρι, το κριθάρι και τον χειμερινό ελαιοκράμβη, και έχουν διαταράξει την εξαναγκασμένη νάρκη σε μέρος των πολυετών φυτειών.

Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες θα χαρακτηρίζονται από αυξημένη δυναμική. Μετά τη βραχυπρόθεσμη πτώση των θερμοκρασιών στις αρχές του μήνα, αναμένεται σημαντική βελτίωση των θερμικών συνθηκών κατά την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Οι προβλεπόμενες υπεράνω του κανονικού θερμοκρασίες, με μέγιστες τιμές έως και 20°C, θα οδηγήσουν σε ενεργοποίηση της βλάστησης των φθινοπωρινών σποράς και των πρώιμων καρποφόρων σε ανθοφορία στις αγροτικές περιοχές της χώρας.

Στο τέλος της πρώτης δεκαήμερης περιόδου και κατά το πρώτο μισό της δεύτερης δεκαήμερης περιόδου, οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες θα καθοριστούν από θερμοκρασίες γύρω και κάτω από τα κλιματολογικά κανονικά, γεγονός που θα περιορίσει την ανάπτυξη των αγροτικών καλλιεργειών. Στη Βόρεια Βουλγαρία και στα υψίπεδα, όπου δεν αποκλείεται η βροχόπτωση συμπεριλαμβανομένου χιονιού, θα παρατηρηθεί εξασθένηση και διακοπή της βλάστησης στις φθινοπωρινές σποράς. Στη Νότια Βουλγαρία, οι τιμές των μέσων ημερήσιων θερμοκρασιών θα είναι κοντά στο βιολογικό ελάχιστο που απαιτείται για την ανάπτυξη των χειμερινών δημητριακών και του χειμερινού ελαιοκράμβη.

Μέχρι τα μέσα Μαρτίου, οι φάσεις του прηξίματος των οφθαλμών και της ρήξης των οφθαλμών στα πρώιμα είδη (αμυγδαλιά, βερίκοκο, ροδάκινο) θα συμβαίνουν στα καρποφόρα δέντρα στις νότιες περιοχές της χώρας. Κατά την περίοδο αυτή, δεν προβλέπονται κρίσιμες ελάχιστες θερμοκρασίες για τις καλλιέργειες στις πεδιάδες.

Η συχνή βροχόπτωση κατά το πρώτο μισό του μήνα θα εμποδίσει, σε πολλά μέρη της χώρας, την έγκαιρη εκτέλεση εποχιακών αγροτεχνικών εργασιών – επιτόπια λίπανση των φθινοπωρινών σποράς με αζωτούχα ορυκτά λιπάσματα, προσπορευτική καλλιεργητική επεξεργασία του εδάφους και σπορά πρώιμων ανοιξιότικων καλλιεργειών (βίκος, βρώμη, μπιζέλι, ανοιξιότικο κριθάρι). Πιο κατάλληλες συνθήκες για την εκτέλεση προανθητικών ψεκασμών σε οπωρώνες θα προκύψουν κατά την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου και στις αρχές της δεύτερης δεκαήμερης περιόδου.

Πηγή: NIMH-BAS